

BIJSLUITER

Activyl spot-on oplossing voor honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE: Registratiehouder: Intervet International BV - Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer - Nederland
 Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Intervet Productions S.A. - Rue de Lyons - 27460 Igoville - Frankrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL: Activyl 100 mg spot-on oplossing voor zeer kleine honden - Activyl 150 mg spot-on oplossing voor kleine honden - Activyl 300 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden - Activyl 600 mg spot-on oplossing voor grote honden - Activyl 900 mg spot-on oplossing voor extra grote honden - Indoxacarb

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN: Werkzaam bestanddeel: Iedere ml bevat 195 mg indoxacarb. Bevat per pipet:

	Volume (ml)	Indoxacarb (mg)
Activyl spot-on oplossing voor zeer kleine honden	0,51	100
Activyl spot-on oplossing voor kleine honden	0,77	150
Activyl spot-on oplossing voor middelgrote honden	1,54	300
Activyl spot-on oplossing voor grote honden	3,08	600
Activyl spot-on oplossing voor extra grote honden	4,62	900

Bevat ook isopropylalcohol 354 mg/ml. - Helderde, kleurloze tot gele oplossing.

4. INDICATIES: Bestrijding en preventie van vlooiëninfestaties (*Ctenocephalides felis*). Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis (VAD). Onvolwassen stadia van vlooiën in de directe omgeving van het dier worden gedomd na contact met dieren die met Activyl behandeld zijn.

5. CONTRA-INDICATIES: Geen.

6. BIJWERKINGEN: Incidenteel kan een korte periode van spekselen voorkomen als het dier de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening (zie rubriek 9) zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken.

Tijdelijk krabben of haaruitval op de plaats van toediening kan voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling. De toediening van het product kan tijdelijk een lokale, vette aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het middel. De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling: - zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling). - vaak (1 tot 10 van de 100 dieren). - soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren). - zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren). - zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Hond.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG:

De aanbevolen dosering is 15 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,077 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de hond:


Gewicht van de hond (kg)	Te gebruiken grootte van de pipet	Volume (ml)	Indoxacarb (mg/kg)
≤ 6,5	Activyl spot-on oplossing voor zeer kleine honden	0,51	Minimum van 15
6,6-10	Activyl spot-on oplossing voor kleine honden	0,77	15-23
10,1-20	Activyl spot-on oplossing voor middelgrote honden	1,54	15-30
20,1-40	Activyl spot-on oplossing voor grote honden	3,08	15-30
40,1-60	Activyl spot-on oplossing voor extra grote honden	4,62	15-23
> 60	De geschikte combinatie van pipetten dient te worden gebruikt		

Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel vlooiëninfestaties gedurende ten minste 4 weken voorkomen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING: Open een sachet en haal de pipet eruit

Stap 1: Het dier dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen. Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe. Bij grotere honden dient de gehele inhoud van de pipet(ten) gelijkmatig te worden toegediend op twee of drie of vier plekken, op verschillende plaatsen langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.



Dien geen dusdanig grote hoeveelheid oplossing op één plaats toe dat de oplossing van de flank van het dier kan lopen.

10. WACHTTERMIJN: Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN: Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos, folie en pipet. Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: De veiligheid is niet aangetoond bij honden jonger dan 8 weken. De veiligheid is niet aangetoond bij honden lichter dan 1,5 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Men dient ervoor te zorgen dat de dosis wordt aangebracht op een plaats waar het dier het niet kan aflikken en te verzekeren dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling.

Men dient ervoor te zorgen dat de inhoud van de pipet of de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen van het te behandelen dier en/of andere dieren. Het product blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De dieren mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Houd het product in het sachet tot gebruik. Dit product is zeer brandbaar. Houd op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Dit product bevat indoxacarb. Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen dit product niet te gebruiken. Vermijd contact met de ogen. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt. Was de handen direct na gebruik. Het sachet is kindveilig. Houd de gebruikte pipet buiten het zicht en bereik van kinderen.

Dracht: Niet gebruiken tijdens de dracht.

Lactatie: Het gebruik wordt niet aanbevolen tijdens de lactatie.

Vruchtbaarheid: Niet gebruiken bij fokdieren.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Tijdens klinische studies is Activyl gelijktijdig toegediend met deltamethrin halsbanden die waren geïmpregneerd met tot 4% deltamethrin, zonder bewijs van hiermee samenhangende bijwerkingen.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN:

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijderd. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN: Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA): <http://www.ema.europa.eu/>.

15. OVERIGE INFORMATIE: Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. Doos met 1 pipet - Doos met 4 pipetten - Doos met 6 pipetten.

activyl®

NOTICE

Activyl solution pour spot-on pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT: Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Intervet International BV - Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer - Pays-Bas - **Fabricant responsable de la libération des lots:** Intervet Productions S.A. - Rue de Lyons - 27460 Igoville - France

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE: Activyl 100 mg solution pour spot-on pour chiens de très petite taille - Activyl 150 mg solution pour spot-on pour chiens de petite taille - Activyl 300 mg solution pour spot-on pour chiens de taille moyenne - Activyl 600 mg solution pour spot-on pour chiens de grande taille - Activyl 900 mg solution pour spot-on pour chiens de très grande taille - Indoxacarb.

3. LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS: Principe actif: Chaque ml contient 195 mg d'indoxacarbe. Chaque pipette d'Activyl délivre:

	Volume (ml)	Indoxacarbe (mg)
Activyl solution pour spot-on pour chiens de très petite taille	0,51	100
Activyl solution pour spot-on pour chiens de petite taille	0,77	150
Activyl solution pour spot-on pour chiens de taille moyenne	1,54	300
Activyl solution pour spot-on pour chiens de grande taille	3,08	600
Activyl solution pour spot-on pour chiens de très grande taille	4,62	900

Contient également 354 mg/ml d'alcool isopropylique. Solution limpide, de couleur jaune à incolore.

4. INDICATIONS: Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*). Le médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Suite au contact avec des animaux de compagnie ayant été traités avec Activyl, les stades de puces en développement se trouvant dans leur environnement immédiat sont éliminés.

5. CONTRE-INDICATIONS: Aucune.

6. EFFETS INDÉSIRABLES: Une hypersalivation de courte durée peut occasionnellement être observée si l'animal lèche le site d'application immédiatement après traitement. Ceci n'est pas une intoxication et les signes disparaissent en quelques minutes sans traitement. Une application correcte (voir rubrique 9) minimise le risque de léchage du site d'application. Une irritation transitoire ou une perte de poils au site d'application peut survenir. Ces effets se résolvent habituellement sans traitement. Après application du médicament vétérinaire, le site d'application peut prendre un aspect huileux temporairement, ou les poils peuvent être collés. Des résidus séchés, de couleur blanche, peuvent également être observés. Ces effets sont normaux et se résolvent généralement dans les deux jours après administration. Ces changements n'affectent ni l'innocuité, ni l'efficacité du médicament vétérinaire. La fréquence des effets indésirables est définie en utilisant la convention suivante: - très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 au cours d'un traitement). - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100). - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000). - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000). - très rare (moins d'un animal sur 10 000, y compris les cas isolés). Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCES CIBLES: Chiens.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION: Chez les chiens, la dose recommandée est de 15 mg d'indoxacarbe par kg de poids vif, soit 0,077 ml de solution par kg de poids vif. Le tableau suivant définit la taille des pipettes à utiliser en fonction du poids du chien:

Poids du chien (kg)	Taille de la pipette à utiliser
≤ 6,5	Activyl 100 mg solution pour spot-on pour chiens de très petite taille
6,6-10	Activyl 150 mg solution pour spot-on pour chiens de petite taille
10,1-20	Activyl 300 mg solution pour spot-on pour chiens de taille moyenne
20,1-40	Activyl 600 mg solution pour spot-on pour chiens de grande taille
40,1-60	Activyl 900 mg solution pour spot-on pour chiens de très grande taille
> 60	Utiliser l'association de pipettes appropriées

Après une administration unique, le médicament vétérinaire protège de l'infestation par les puces pendant au moins 4 semaines.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE: Ouvrir un sachet et retirer la pipette.

Étape 1: L'animal doit se tenir debout pour une application aisée. D'une main, tenir la pipette en position verticale, loin du visage, et de l'autre main, casser l'embout en l'inclinant et en le rabattant sur lui-même.

Étape 2: Écarter les poils jusqu'à ce que la peau soit visible et placer l'embout de la pipette contre la peau, entre les omoplates. Presser la pipette fermement afin d'en vider entièrement le contenu directement sur la peau.

Chez les chiens de grande taille, la totalité du contenu de la pipette doit être appliquée uniformément en deux, trois ou quatre sites d'application différents, le long de la ligne du dos, à partir de l'épaule jusqu'à la base de la queue.



Ne pas appliquer une quantité excessive de solution au même endroit, ce qui pourrait entraîner son écoulement sur le côté de l'animal.

10. TEMPS D'ATTENTE: Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION: Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Pas de précautions particulières de conservation. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, le blister et la pipette. Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES: Précautions particulières pour chaque espèce cible: L'innocuité n'a pas été établie chez les chiens âgés de moins de 8 semaines. L'innocuité n'a pas été établie chez les chiens dont le poids est inférieur à 1,5 kg.

Präcautions particulières d'utilisation chez l'animal: Il est important d'appliquer le traitement sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher, et de s'assurer que les animaux ne se lèchent pas les uns les autres après application et que le contenu de la pipette ou la dose appliquée n'entre pas en contact avec les yeux de l'animal traité ou d'autres animaux.

Le produit demeure efficace même après un shampooing, une immersion dans l'eau (nage, bain) et une exposition au soleil. Toutefois, les animaux ne doivent pas nager ou être traités avec un shampooing pendant les 48 heures qui suivent le traitement.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux: Conserver le produit dans le sachet jusqu'à utilisation. Ce produit est hautement inflammable. Conserver à l'écart de toute source de chaleur, source d'étincelles, flamme ou autres sources d'ignition. Ne pas manger, ne pas boire ou fumer pendant l'utilisation du médicament vétérinaire. Ce produit contient de l'indoxacarbe. Les personnes présentant une hypersensibilité connue à l'indoxacarbe ne doivent pas manipuler ce produit. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact oculaire, rincer lentement et doucement avec de l'eau. Se laver immédiatement les mains après utilisation. Le sachet possède une sécurité-enfant. Tenir la pipette usagée hors de la vue et de la portée des enfants.

Gravidité: Ne pas utiliser durant la gestation.

Lactation: Utilisation non recommandée durant la lactation.

Fertilité: Ne pas utiliser sur les animaux destinés à la reproduction.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions: Lors des études cliniques, Activyl a été co-administré avec des colliers imprégnés à 4 % de deltaméthrine sans que des effets indésirables associés aient été mis en évidence.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT: Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVEE: Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles sur le site web de l'Agence européenne des médicaments (<http://www.ema.europa.eu/>).

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES: Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Boîte de 1 pipette - Boîte de 4 pipettes - Boîte de 6 pipettes.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG: Eine Umverpackung öffnen und die Pipette entnehmen.



Keine zu hohen Lösungsmengen, die zum Herunterlaufen an der Seite des Tieres führen könnten, an einer einzelnen Stelle auftragen.

10. WARTEZEIT: Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE: Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Nach dem Auf dem Karton, dem Blister und der Pipette angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

12. BESONDERE WARNHINWEISE: Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Die Verträglichkeit bei Hunden im Alter unter 8 Wochen ist nicht untersucht. Die Verträglichkeit bei Hunden mit einem Körpergewicht von unter 1,5 kg ist nicht untersucht.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren: Es ist darauf zu achten die Dosis an einer Körperstelle aufzutragen, von der das Tier sie nicht ablecken kann und es ist sicherzustellen, dass die Tiere nicht unmittelbar nach einer Behandlung gegenseitig Fellpflege betreiben. Es ist darauf zu achten, dass der Inhalt der Pipette oder die aufgetragene Dosis nicht in Kontakt mit den Augen des behandelten Tieres bzw. eines anderen Tieres kommt. Das Tierarzneimittel bleibt auch nach Shampooieren, Eintauchen ins Wasser (Schwimmen, Baden) und bei Sonneneinstrahlung wirksam. Dennoch sollten Tiere in den ersten 48 Stunden nach der Behandlung nicht schwimmen und sie sollten nicht shampooiert werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Folientüte belassen. Dieses Tierarzneimittel ist leicht entzündlich. Von Hitze, Funken, offenen Flammen oder sonstigen Zündquellen fernhalten. Während der Anwendung des Tierarzneimittels nicht rauchen, trinken oder essen. Das Tierarzneimittel enthält Indoxacarb. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Indoxacarb sollten dieses Produkt nicht anwenden. Kontakt des Pipetteninhaltes mit den Augen vermeiden. Sollte dies dennoch vorkommen, langsam und sanft mit Wasser spülen. Die Hände sofort nach der Anwendung waschen. Die Folientüte ist kinder-sicher. Gebrauchte Pipetten außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Trächtigkeit: Nicht anwenden während der Trächtigkeit.

Laktation: Die Anwendung während der Laktation wird nicht empfohlen.

Fortpflanzungsfähigkeit: Nicht bei Zuchttieren anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: In klinischen Studien wurde Activyl gleichzeitig mit Halsbändern angewandt, die mit bis zu 4% Deltamethrin imprägniert waren, ohne dass hieraus Hinweise auf unerwünschte Effekte abzuleiten waren.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH: Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE: Detaillierte Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie auf der Website der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) unter <http://www.ema.europa.eu/>.

15. WEITERE ANGABEN: Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht. Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung. Faltschachtel mit einer Pipette - Faltschachtel mit 4 Pipetten - Faltschachtel mit 6 Pipetten.

activyl®

GEBRAUCHSINFORMATION

Activyl Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST: Zulassungsinhaber:

Intervet International BV - Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer - Niederlande - Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller: Intervet Productions S.A. - Rue de Lyons - 27460 Igoville - Frankreich

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS: Activyl 100 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine Hunde - Activyl 150 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine Hunde - Activyl 300 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für mittlere Hunde - Activyl 600 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für große Hunde - Activyl 900 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr große Hunde -

3. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE: Wirkstoff: 1 ml Lösung enthält 195 mg Indoxacarb. Jede Ein-Dosen-Pipette enthält:

	Inhalt (ml)	Indoxacarb (mg)
Activyl Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine Hunde	0,51	100
Activyl Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine Hunde	0,77	150
Activyl Lösung zum Auftropfen auf die Haut für mittlere Hunde	1,54	300
Activyl Lösung zum Auftropfen auf die Haut für große Hunde	3,08	600
Activyl Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr große Hunde	4,62	900

Enthält auch Isopropylalkohol 354 mg/ml. Klare, farblose bis gelbliche Lösung.

4. ANWENDUNGSGEBIETE: Zur Behandlung und Vorbeugung von Flohbefall (*Ctenocephalides felis*). Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) (FAD) eingesetzt werden. Entwicklungsstadien der Flöhe in der unmittelbaren Umgebung der Haustiere werden durch Kontakt mit Activyl-behandelten Tieren abgetötet.

5. GEGENANZEIGEN: Keine

6. NEBENWIRKUNGEN: Bei Tieren, die unmittelbar nach der Behandlung die Applikationsstelle abgeleckt haben, kann gelegentlich eine kurze Phase vermehrter Speichelsekretion auftreten. Dies ist kein Anzeichen für eine Intoxikation und verschwindet innerhalb weniger Minuten ohne Behandlung. Eine ordnungsgemäße Anwendung (siehe Abschnitt 9) minimiert das Ablecken der Auftragsstelle. Vorübergehender Juckreiz oder Haarverlust an der Applikationsstelle können auftreten. Diese Effekte klingen in der Regel ohne Behandlung wieder ab. Das Auftragen des Tierarzneimittels kann örtlich ein vorübergehendes öliges Aussehen, Verkleben oder Verkrusten des Fells an der Auftragsstelle verursachen. Es kann auch ein trockener weißer Rückstand beobachtet werden. Dieses ist normal und verschwindet im Allgemeinen 1 - 4 Tage nach der Anwendung. Diese Veränderungen beeinflussen die Verträglichkeit und Wirksamkeit des Tierarzneimittels nicht. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert: - Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung). - Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren) . - Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren) . - Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren) . - Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte). Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERARTEN: Hund

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG: Die empfohlene Dosis für Hunde beträgt 15 mg Indoxacarb/kg Körpergewicht, entsprechend 0,077 ml/kg Körpergewicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt die für verschiedene Körpergewichte der Hunde zu verwendenden Pipettengrößen:

Gewicht des Hundes (kg)	Zu verwendende Pipettengröße
≤ 6,5	Activyl 100 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine Hunde
6,6 - 10	Activyl 150 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine Hunde
10,1 - 20	Activyl 300 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für mittlere Hunde
20,1 - 40	Activyl 600 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für große Hunde
40,1 - 60	Activyl 900 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr große Hunde
> 60	Die entsprechende Kombination von Pipetten ist zu verwenden

Nach einer einmaligen Anwendung verhindert das Tierarzneimittel weiteren Flohbefall für mindestens 4 Wochen.