

Preventef[®] ad us. vet.

UITWENDIG ANTIPARASITAIR MIDDEL / ANTIPARASITAIRE A USAGE EXTERNE / ZUR ÄUßERLICHEN ANWENDUNG

HOND - CHIEN - HUND
GROTE HOND - GRAND CHIEN - GROSSER HUND
(DIMPYLATE/DIMPYLAT)

■ **INDICATIE:** Bestrijding van teken en vlooiën.

■ **DOSERING EN GEBRUIKSWIJZE**

Just voor het gebruik de halsband uit zijn oorspronkelijke verpakking nemen, hem rond de hals van het dier bevestigen en vervolgens aanpassen. Het overbodige stuk halsband afknippen. De halsband dient permanent door het dier gedragen te worden.

Werkingsduur :

5 maanden tegen vlooiën en 4 maanden tegen teken.

Tegen vlooiën : het is aangeraden gedurende het ganse jaar een halsband te dragen. Tegen teken en dus tegen babesiosis is het aangeraden :

- 1 tot 2 halsbanden te voorzien tussen het einde van de winter en de zomer,
- 1 halsband te voorzien voor de herfst.

■ **CONTRA-INDICATIES:** Geen.

■ **ONGEWENSTE EFFECTEN**

Het dragen van de halsband veroorzaakt een verlaging van het plasmacholinesterase, dit echter zonder gevaar voor het dier. Deze plasmawaarden verhogen, zodra de halsband verwijderd wordt.

■ **BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN**

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

■ **GEBRUIK TIJDENS DE DRACHT:** Onbekend.

■ **INTERACTIES**

Uit voorzorgsmaatregelen is het aangeraden de halsband 24 tot 48 uur voor iedere anesthesie te verwijderen. Geen andere insecticiden (organofosfaten of carbamaten) gelijktijdig met de halsband gebruiken.

■ **OVERDOSERING/ANTIDOTUM**

In geval van intoxicatie kan men atropine toedienen in een dosis van 0,1 mg/kg intraveneus of subcutaan. Een tweede dosis kan toegediend worden in functie van de evolutie van de symptomen. Klinische symptomen van intoxicatie zijn : dyspnee, overvloedige speekselvloeï en stijfheid van de ledematen, met daarop volgend motorische incoördinatie.

■ **DIERSOORT WAARVOOR HET GENEESMIDDEL BESTEMD IS, TOEDIENINGSWIJZE, VERPAKKING EN WIJZE VAN AFLEVERING**

Antiparasitaire halsband voor uitwendig gebruik bij de hond.

Verpakking : Zakje met een halsband van 20 g (ongeveer 57 cm lengte) / 37 g (ongeveer 65 cm lengte).

Vrije verkoop.

■ **BEWARING**

Bij kamertemperatuur (tot 25°C), in zijn oorspronkelijke verpakking. Rekening houden met de vervaldatum vermeld op de verpakking : EXP. maand/jaar (de vervaldatum is de eerste dag van de vermelde maand).

■ **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

■ **DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN :** 09/2012

■ **INDICATION :** Lutte contre les tiques et les puces.

■ **POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI**

Retirer le collier de son emballage étanche, juste avant l'emploi, et le fixer au cou de l'animal en l'ajustant. Couper la partie excédentaire. Le collier doit être laissé en permanence au cou de l'animal.

Durée d'action : 5 mois contre les puces et 4 mois contre les tiques.

Contre les puces, le port du collier est indiqué toute l'année. Contre les tiques, et par conséquent la piroplasmose, il est indiqué de prévoir successivement, compte tenu de la durée d'activité du collier :

- 1 à 2 colliers depuis la fin de l'hiver à l'été,
- 1 collier en automne.

■ **CONTRE-INDICATIONS :** Néant.

■ **EFFETS INDESIRABLES**

Le port du collier entraîne une dépression des taux de cholinestérase plasmatique sans danger pour l'animal. Ces taux commencent à remonter dès le retrait du collier.

■ **PRECAUTIONS PARTICULIERES**

Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier, ni le sucer.

■ **UTILISATION EN CAS DE GESTATION** : Néant.

■ **INTERACTIONS**

Par mesure de précaution, il est recommandé d'enlever le collier 24 à 48 heures avant toute anesthésie. Ne pas administrer d'autres insecticides (organophosphorés ou carbamates) en même temps que le collier.

■ **SURDOSAGE/ANTIDOTE**

En cas d'intoxication, l'antidote est le sulfate d'atropine, qui doit être administré à raison de 0,1 mg/kg par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Le renouvellement est fonction de l'évolution des symptômes d'intoxication, dont les signes cliniques sont dyspnée, une salivation intense, une raideur des membres pouvant conduire à une incoordination motrice.

■ **ESPECES DE DESTINATION, FORME, VOIE D'ADMINISTRATION, CONDITIONNEMENT ET MODE DE DELIVRANCE**

Collier insecticide, à usage externe, pour chiens.

Conditionnement : Etui d'1 sachet contenant 1 collier de 20 g (env. 57 cm de longueur) / de 37 g (env. 65 cm de longueur).

Délivrance libre.

■ **CONSERVATION**

A température ambiante (jusqu'à 25°C) dans son emballage d'origine. Se référer à la date limite inscrite sur l'emballage : EXP. mois/année (la date d'expiration commence le premier jour du mois indiqué).

■ **PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR L'ELIMINATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES NON UTILISES OU DES DECHETS DERIVES DE CES MEDICAMENTS, LE CAS ECHEANT**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

■ **DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE** : 09/2012

■ **ANWENDUNGSGEBIETE**: Gegen Zecken und Flöhe.

■ **DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG**

Das Halsband erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Packung nehmen und dem Tier locker am Hals befestigen. Überlängen werden gekürzt. Das Halsband soll als Dauerhalsband getragen werden.

Wirkungsdauer : 5 Monate gegen Flöhe und 4 Monate gegen Zecken.

Gegen Flöhe sollte das Halsband das ganze Jahr übergetragen werden. Gegen Zecken und infolgedessen gegen Piroplasmose empfiehlt sich aufgrund der Dauer der Wirksamkeit, 1-2 Halbbänder vom Ende des Winters bis zum Sommer und 1 Halsband im Herbst anzulegen.

■ **GEGENANZEIGEN** : Keine.

■ **UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN**

Durch das Tragen des Halsbandes kommt es zum Abfall des Cholinesterasespiegels, das ohne Gefahr für das Tier ist, sobald das Halsband abgenommen wird, steigen diese Werte wieder an.

■ **BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN**

Kinder sollen nicht mit dem Halsband spielen oder zum Mund führen.

■ **ANWENDUNG WÄHREND DER TRÄCHTIGKEIT**

Es liegen keine Daten vor.

■ **WECHSELWIRKUNGEN**

Als Vorsichtsmaßnahme empfiehlt sich, das Halsband 24 bis 48 Stunden vor einer Anästhesie abzunehmen. Beim Tragen des Halsbandes gleichzeitig keine anderen Antiparasitika (Organophosphate oder Carbamate) anwenden.

■ **ÜBERDOSIERUNG/ANTIDOT**

Bei einer Vergiftung wird Atropinsulfat als Antidot in einer Dosierung von 0,1 mg/kg intravenös oder subkutan eingesetzt. Je nach Verlauf der Erscheinungen wird eine zweite Injektion gegeben. Klinische Symptome einer Überdosierung sind : Atemnot ; verstärkter Speichelfluss ; steife Gliedmassen, die zu Bewegungsstörungen führen können.

■ **TIERARTEN, BEI DENEN DAS ARZNEIMITTEL ANGEWENDET WERDEN SOLL, DARREICHUNGSFORM, ART DER ANWENDUNG, HANDELSFORM UND ABGABE**

Insektizides Halsband zur äusserlichen Anwendung bei Hunden.

Packung mit einem Halsband zu 20 g in einer Schutzhülle (Länge ca. 57 cm) / 37 g in einer Schutzhülle (Länge ca. 65 cm).

Rezeptfreie Abgabe.

■ **AUFBEWAHRUNG**

Bei Raumtemperatur (bis 25°C) in der Originalpackung. Bitte beachten Sie das Verfalldatum auf der Packung : EXP. Monat/Jahr (das Verfalldatum ist der erste Tag des angegebenen Monats).

■ **BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

■ **GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE** : 09/2012

SAMENSTELLING / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

Dimpylate/Dimpylat 15 g - Oleic./Linoleic./Linolenic.ac.ester. - Diethylhexyl.phtalas. - Epoxydat.soja oleum - Calc. stearas - Flash noir 19976® - Ferr. oxyd. rubr. - Flash beige 40232® - Silic. oxyd. colloïd. - Polyvinyl. chlorid. q.s. ad 100 g.

BE-V159722 - BE-V159713

DIERGEENSKUNDIG GEBRUIK / USAGE VETERINAIRE / ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG

FABRIKANT - REGISTRATIEHOUDER / FABRICANT - TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT / HERSTELLER - REGISTRIERUNGSMANAGER

VIRBAC - F - 06516 Carros

DISTRIBUTEUR / VERTRIEB

Virbac Belgium - B - 3001 Leuven