

Defendog permethrine 2%

**INSEKTICIDE OPLOSSING
SOLUTION INSECTICIDE
INSEKTIZID-LÖSUNG****■ NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE:**

Registreerhouder en fabrikant: VIRBAC - 1ère Avenue - 2065 m - L.L.D. - 06516 CARROS - FRANCE

Distributeur: Virbac Belgium - B - 3001 Leuven

■ GEHALTE AAN VERZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN:

Werkzaam bestanddeel: Technische Permethrine (40/60) 2 g

Hulpstoffen: Luviset CAN*, Propyleen Glycol Methyl Ether (PCME), jasmijnparfum, gezuiverd water.

■ INDICATIES: Behandeling en preventie van infestaties met vlooiën (*Ctenocephalides felis*) en teken (*Rhipicephalus sanguineus*) bij honden. Behandelde honden zijn gedurende 60 dagen tegen vlooiën beschermd. Behandelde honden zijn gedurende 30 dagen tegen teken beschermd.**■ CONTRA-INDICATIES:**

- Niet gebruiken bij katten.
- Niet gebruiken bij puppies jonger dan 3 maanden.
- Niet gebruiken bij zieke of herstellende honden.
- De aanbevolen dosering niet overschrijden.

■ BIJWERKINGEN: Geen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.**■ DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS:** Hond.**■ DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING:** 50 ml oplossing voor 10 kg lichaamsgewicht, hetgeen overeenkomt met 100 mg permethrine per kg lichaamsgewicht (ongeveer 5 keren sproeien per kg lichaamsgewicht). DEFENDOG op de vacht van de hond sproeien. Vermijd het product in de ogen van het dier te sproeien. Laten drogen, niet afdrogen.**■ AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING:** Na de toediening, voorkomen dat het dier vaak zwemt of vaak wordt behandeld met een shampoo, aangezien dit de werkzaamheid van het product kan verminderen. OPGELET : Defendog bevat een vluchtige stof die onschadelijk is voor de huid van de hond maar die geschilderde, gelakte of gemestte oppervlakken kan aantasten. Het wordt strikt aangeraden om de hond buitenshuis te behandelen en de vacht volledig te laten drogen voor u de hond in aanraking laat komen met dergelijke oppervlakken.**■ SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN:** Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 30°C. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.**■ SPECIALE WAARSCHUWINGEN:****Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

- Veelvuldig en herhaald gebruik van antiparasitaire middelen kan tot resistentie leiden.

- Indien meerdere honden in één huis wonen, moeten ze allemaal behandeld worden. Indien er katten in hetzelfde huis wonen, moeten die worden behandeld met een voor katten geregistreerd product.

- De vlooiën van het dier nestelen zich vaak in de mand, de slaapplek en de plaatsen waar het dier geregeld gaat liggen zoals tapijten en zitbanken. Ook die plaatsen moeten met een aangepast insecticide worden behandeld en regelmatig gestofzuigd worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

- Niet inademen.

- Gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

- Aanraking met de huid en met de ogen vermijden.

- Handen en besmette huid wassen na gebruik.

- Langdurige blootstelling aan het product vermijden.

- Contact met de behandelde hond vermijden tot de vacht droog is.

- Gebruikers met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden op basis van pyrethroides moeten elk contact met het product vermijden.

- Bij de mens kan contact met permethrine tot een parasthesie van de huid leiden, met een latentperiode van 1 tot 2 uren.

- Indien het product een ongeluk insgelikt wordt, raadpleeg een arts. Bij aanhoudende huidirritatie en/of oogirritatie, raadpleeg een arts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): Typische klinische symptomen die te wijten zijn aan de giftigheid van pyrethroides: overmatige speekselvloed, diarree, spiertremlingen en hypesithesie. Bij ernstig aangetaste dieren kan het volgende worden waargenomen: hypothermie, dyspneu en convulsies. Indien zijn symptomen van overdosering voordoen, de hond wassen met een shampoo zonder insecticide, en de dierenarts dient een symptomatische behandeling toe te dienen. Er bestaat geen specifiek antgift voor vergiftigingen veroorzaakt door pyrethroides.**Gebruik tijdens dracht of lactatie:** Niet gebruiken bij zogende dieren**■ SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN:**

Adequate voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden zodat het product niet in het milieu terecht komt. Uitzonderlijk gevaarlijk voor vissen of andere waterorganismen. Vijvers, waterlopen of sloten niet besmetten met het product met de verpakking. Het product is ook erg giftig voor bijen.

■ DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN: 09/2012**■ OVERIGE INFORMATIE:** Vrije verkoop. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.**■ NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT :**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant: VIRBAC - 1ère Avenue - 2065 m - L.L.D. - 06516 CARROS - FRANCE

Distributeur: Virbac Belgium - B - 3001 Leuven

■ LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS :

Principe actif : Permethrine technique (40/60) 2 g

Excipients : Luviset CAN*, Methyl Ether de Propylène Glycol, Parfum Jasmijn, Eau purifiée.

■ INDICATIONS : Traitement et protection contre les infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) et les tiques (*Rhipicephalus sanguineus*) chez le chien. La protection contre la réinfestation par les puces est effective pendant 60 jours après le traitement. La protection contre la réinfestation par les tiques est assurée pendant 30 jours.**■ CONTRE-INDICATIONS :**

- Ne pas utiliser chez le chat
- Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 3 mois
- Ne pas utiliser sur des chiens malades ou convalescents.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.

■ EFFETS INDÉSIRABLES : Néant. Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.**■ ESPÈCES CIBLES :** Chiens**■ POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION :** 50 ml de solution pour 10 kg de poids vif, équivalent à 100 mg de permethrine par kg de poids vif (environ 5 pressions du vaporisateur par kg de poids vif).

Pulvériser DEFENDOG sur le pelage du chien. Éviter de pulvériser sur les yeux de l'animal. Laisser sécher sans essuyer.

■ CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE : Éviter que l'animal se baigne souvent ou soit fréquemment shampooiné après l'application parce que ceci

pourrait diminuer l'efficacité de la spécialité. Attention : Defendog contient un composant volatil inoffensif pour le peau du chien mais qui peut altérer les surfaces peintes, vernies ou teintes. Il est formellement conseillé de traiter le chien à l'extérieur et de laisser sécher complètement le pelage avant de remettre le chien en contact avec de telles surfaces.

■ **CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION** : Protéger des rayons solaires et ne pas exposer à des températures supérieures à 30°C. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

■ **MISES EN GARDE PARTICULIÈRES** :

■ **Précautions particulières d'emploi chez les animaux**

- L'utilisation fréquente et répétée d'antiparasitaires peut conduire au développement de résistance.

- Si plusieurs chiens sont présents dans un même foyer, ils doivent tous être traités. Si des **chats** sont présents dans un même foyer, ils doivent être traités avec un **produit enregistré pour les chats**.

- Les puces de l'animal infestent souvent le panier, la zone de couchage et les zones régulières de repos comme les tapis et les canapés. Ces endroits devront être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

■ **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

- Ne pas inhaler.

- Utiliser dans un endroit bien ventilé.

- Éviter tous contacts avec la peau et les yeux.

- Se laver les mains et la peau contaminée après utilisation.

- Éviter une exposition prolongée au produit.

- Éviter le contact avec le chien traité jusqu'à ce que le pelage soit sec.

- Les utilisateurs avec une hypersensibilité connue aux insecticides à base de pyréthroides doivent éviter tout contact avec le produit.

- Chez l'homme, le contact avec la perméthrine peut produire une paresthésie cutanée avec une période de latence de 1 – 2 heures.

- En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée persistante et/ou d'irritation oculaire, consulter un médecin.

■ **Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)** : Des symptômes cliniques typiques dus à la toxicité des pyréthroides comprennent : hypersalivation, diarrhée, tremblements musculaires et hyperesthésie. Chez des animaux sérieusement affectés, il est possible d'observer : pyrexémie, dyspnée et convulsions. Si des symptômes de surdosage surviennent, laver le chien avec un shampoing non-insecticide et le vétérinaire doit administrer un traitement symptomatique. Il n'existe pas d'antidote spécifique pour les intoxications dues aux pyréthroides.

■ **Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte** : Ne pas utiliser chez les femelles en lactation.

■ **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRIAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHEANT** : Les mesures de précaution adéquates doivent être prises pour que le produit ne se retrouve pas dans le milieu environnant.

Extrêmement dangereux pour les poissons et autres organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, cours d'eau ou fossés avec le produit ou l'emballage. Le produit est également très toxique pour les abeilles.

■ **DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE** : 09/2012

■ **INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES** : Délivrance libre. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

■ **NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE**

VERANTWORTLICH IST:

Zulassungsinhaber und Hersteller: VIRBAC - 1ère Avenue - 2065 m - L.L.D. - 06516 CARROS - FRANCE

Vertrieb: Virbac Belgium - B - 3001 Leuven

■ **WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE:**

Wirkstoff: Technisches Permethrin (40:60)..... 2 g

Sonstige Bestandteile: Luvisol CAN®, Methyl ether aus Propylenglykol, Duftstoff (Jasmin), gereinigtes Wasser.

■ **ANWENDUNGSGEBIETE**: Zur Behandlung und Vorbeugung von Floh- und Zeckenbefall (*Ctenocephalides felis* und *Rhipicephalus sanguineus*) bei Hunden. Nach der Behandlung wirkt das Mittel 2 Monate gegen Flöhe und 1 Monat gegen Zecken.

■ **GEGENANZEIGEN**:

- Nicht bei Katzen anwenden.

- Nicht bei Weipen unter 3 Monaten anwenden.

- Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren anwenden.

- Empfohlene Dosis nicht überschreiten.

■ **NEBENWIRKUNGEN**: Nicht zutreffend. Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

■ **ZIELTIERART**: Hund.

■ **DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**: Die Dosierung beträgt 50 ml pro 10 kg Lebendgewicht bzw. 100 mg Permethrin pro kg Lebendgewicht (ca. 5 Pumpstöße pro kg Lebendgewicht). DEFENDOG direkt auf das Hundefell sprühen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen des Tieres. Das Fell nach der Anwendung von selbst trocknen lassen.

■ **HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**: Vermeiden Sie nach der Anwendung ein häufiges Baden des Tieres oder das Waschen des Fells, da hierdurch die Wirksamkeit des Präparates herabgesetzt werden könnte. Achtung : Defendog enthält ein rasch verdampfendes Lösungsmittel, das für die Haut des Hundes vollkommen unschädlich ist, aber zu unerwünschten Effekten auf farbigen oder gestrichenen Oberflächen führen kann.

Aus diesem Grund wird empfohlen, den Hund ausserhalb des Wohnung zu behandeln und das Fell vollständig trocken zu lassen, bevor ein Kontakt mit farbigen oder gestrichenen Oberflächen möglich ist.

■ **BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**: Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht über 30°C lagern. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

■ **BESONDERE WARNHINWEISE**:

■ **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

- Die häufige und wiederholte Anwendung von Parasitenbekämpfungsmitteln kann Resistenzen hervorufen.

- Wenn mehrere Hunde vorhanden sind, müssen alle Tiere behandelt werden. Falls Katzen vorhanden sind, müssen diese mit einem für Katzen zugelassenen

Tierarzneimittel behandelt werden.

- Körbchen, Schlafbereich und regelmäßig aufgesuchte Ruheplätze des Tieres, wie z.B. Teppiche und Sofas, sind häufig auch von Flohbefall betroffen. Daher sollten diese Bereiche mit einem geeigneten Insektenbekämpfungsmittel behandelt und regelmäßig abgeseugt werden.

■ **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender**

- Nicht einatmen.

- Nach Möglichkeit im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen anwenden.

- Jegliche Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

- Hände und kontaminierte Haut nach der Anwendung gründlich waschen.

- Längere Exposition gegenüber dem Mittel vermeiden.

- Jeglichen Kontakt mit dem behandelten Tier vermeiden bis das Fell trocken ist.

- Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber pyrethroidhaltigen Insektenbekämpfungsmitteln sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

- Der Kontakt mit Permethrin kann beim Menschen eine Paresthésie der Haut mit Latenzzeiten von 1-2 Stunden hervorufen.

- Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen. Bei anhaltender Reizung der Haut bzw. der Augen ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

■ **Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel)**: Typische klinische Symptome verursacht durch die Toxizität der Pyrethroide umfassen Hypersalivation, Diarrhöe, muskuläres Zittern und Hyperesthésie. Bei stark betroffenen Tieren können Hypothemie, Dyspnöe und Krämpfe beobachtet werden. Wenn Symptome einer Überdosierung erscheinen, soll der Hund mit einem Shampoo (kein Insektizid-Shampoo) gewaschen werden und eine symptomatische Therapie durch den Tierarzt erfolgen. Es gibt kein spezifisches Antidot für Vergiftungen verursacht durch Pyrethroide.

■ **Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode**: Nicht bei stillenden Weibchen anwenden.

■ **BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSÖRGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**: Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Sehr gefährlich für Fische und andere Wasserorganismen. Teiche, Wasserläufe und Gräben nicht mit dem Produkt oder der deren Verpackung verunreinigen. Das Produkt ist auch für Bienen sehr giftig.

■ **GENEHMIGUNGSDÄTUM DER PACKUNGSBEILAGE**: 09/2012.

■ **WEITERE ANGABEN**: Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht. Rezeptfreie Abgabe.

BE-V175016

81.287407