

Canigen[®] trivalent CHP

VACCIN VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK

■ AANGEWEZEN BIJ

de vaccinatie van honden en pups tegen de ziekte van Carré, hepatitis en parvovirose.

■ HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL

Het lyophilisaat oplossen met bijgevoegd oplosmiddel. De volledige inhoud inspuiten ongeacht de ouderdom of het gewicht van het dier.

Primo-vaccinatie :

- twee vaccinaties van 1 ml onderhuids of intramusculair met 15 dagen tussentijd.
- de 1ste vanaf de 14e à 16e week bij de jonge dieren, de 2de twee weken na de eerste.

Herinenting : Om het jaar.

■ OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDE

Enkel gezonde dieren inenten.

■ BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

Enkel gezonde en ontwormde dieren inenten.

■ DRACHT

Men raadt af drachtige dieren in te enten.

■ DIERSOORT WAARVOOR HET GENEESMIDDEL BESTEMD IS, VORM, TOEDIENINGSWIJZEN, VERPAKKING EN WIJZE VAN AFLEVERING

CANIGEN[®] TRIVALENT wordt voor de inenting van honden en pups gebruikt. Het vaccin kan onderhuids of intramusculair ingespoten worden. Doos van 10 dosissen. Eén dosis bestaat uit een flacon met een gelyophiliseerd vaccin en een flacon met een oplosmiddel.

Op voorschrift van een dierenarts.

■ BEWARING

Op 4°C (van 2 tot 6°C). Tegen licht beschermen. Niet invriezen.

De vervaldatum staat op de verpakking na de afkorting "EXP" de eerste twee cijfers geven de maand aan, de twee volgende het jaar.

■ SAMENSTELLING

Gevriesdroogde entstof :

- min. 10³ DICT₅₀ levend verzwakt virus van de ziekte van Carré / dosis
- min. 300 DICT₅₀ verzwakt honden Adenovirus Type 2 / dosis
- min. 10⁴ DICT₅₀ levend verzwakt honden parvovirus / dosis

Lactos. - L. Glutaminezuur - Dikal. phosph. - Kal. phosph. - Gelat. - Phenolsulfonephtal.

Oplosmiddel :

Aqua ad inject. q.s. ad 1 ml

■ REGISTRATIEHOUDER EN FABRIKANT

VIRBAC S.A. • 1ère avenue • 2065 m • L.I.D. 06516 Carros • FRANCE

■ VERDELER

VIRBAC Belgium S.A. • B - 3001 Leuven

Canigen[®] trivalent CHP

VACCIN A USAGE VETERINAIRE

■ INDIQUE DANS

la vaccination des chiens et des chiots contre la maladie de Carré, l'hépatite et la parvovirose.

■ COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE

Dissoudre le lyophilisat à l'aide du solvant qui l'accompagne et injecter immédiatement, après reconstitution, la totalité du contenu, quel que soit l'âge ou le poids de l'animal.

Primo-vaccination :

- deux inoculations de 1 ml, à 15 jours d'intervalle, par voie sous-cutanée ou intramusculaire.
- cette primo-vaccination peut être effectuée dès l'âge de 14 à 16 semaines chez les chiots.

Rappel :

Un rappel annuel.

■ CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE

Les chiens en mauvais état de santé ne seront pas vaccinés.

■ PRECAUTIONS PARTICULIERES

Ne vacciner que des animaux en parfait état de santé et déparasités.

■ GESTATION

La vaccination est déconseillée chez les chiennes gestantes.

■ ESPECE DE DESTINATION, FORME, VOIES D'ADMINISTRATION, CONDITIONNEMENT ET MODE DE DELIVRANCE

CANIGEN® TRIVALENT est destiné à la vaccination des chiens et des chiots. Il s'agit d'un vaccin lyophilisé, accompagné de solvant. La vaccination peut se faire par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Boîtes de 10 doses. Une dose est constituée d'un flacon de vaccin lyophilisé et d'un flacon de solvant stérile.

Délivrance sur prescription médicale.

■ CONSERVATION

A 4°C (de 2 à 6°C) et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.

Une date de péremption se trouve sur l'emballage, après l'abréviation "EXP" (signifiant "expiration"), suivie de 4 chiffres : les deux premiers représentent le mois et les deux autres l'année.

■ COMPOSITION

Lyophilisat :

- Suspension de virus Carré, atténué, non inactivé : min.10³ TCID₅₀ / dose
 - Suspension d'Adenovirus type 2, atténué, non inactivé : min.300 TCID₅₀ / dose
 - Suspension de Parvovirus Canin vivant atténué : min.10⁴ TCID₅₀ / dose
- Lactose - Ac.L.glutamique- Phosph. dipotassique - Phosphate monopotassique - Gélatine - Phénolsulfonephthaléine.

Solvant :

Aqua ad iniect. q.s. ad 1 ml.

■ TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT ET FABRICANT

VIRBAC S.A. • 1ère avenue • 2065 m • L.I.D. 06516 Carros • FRANCE

■ DISTRIBUTEUR

VIRBAC Belgium S.A. • B - 3001 Leuven

Canigen® trivalent CHP

IMPfstoff für tierärztlichen Gebrauch.

■ INDIKATION

Die Vakzination von Hunden und Welpen gegen Carré-Viren, adenotrope Hundeviren und Hundeparvoviren.

■ GEBRAUCHSANWEISUNG UND MENGENANGABEN

Das Lyophilisat mit Hilfe des beigegebenen Lösungsmittels auflösen. Unmittelbar den gesamten Inhalt injizieren, ungeachtet des Alters oder des Gewichts des Tieres. Erstvakzination :

- zwei Impfungen von jeweils 1 ml im Abstand von 14 Tagen, subkutan oder intramuskulär.
- diese Erstvakzination kann bei jungen Welpen ab 14 bis 16 Wochen durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie : Die Impfung ist jedes Jahr zu wiederholen.

■ FÄLLE IN DENEN DIESES MEDIKAMENT VERMIEDEN WERDEN SOLL

Hunde in schlechtem Gesundheitszustand werden nicht geimpft.

■ BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN

Tiere in schlechtem Gesundheitszustand sowie Hunde, die nicht gegen Parasiten behandelt wurden sind nicht zu impfen.

■ TRÄCHTIGKEIT

Bei trächtigen Hündinnen ist von der Vakzination abzuraten.

■ TIERARTEN, PHARMAZEUTISCHE FORMEN, VERABREICHUNGSWEISE, HANDELSFORMEN, ABGABE

CANIGEN® TRIVALENT ist für die Vakzination von Hunden und Welpen bestimmt.

Die Vakzination kann subkutan oder intramuskulär vorgenommen werden.

Packung mit 10 Dosen : 10 Flaschen lyophilisiertes Vakzin und 10 Flaschen Lösungsmittel. Auf tierärztliche Verschreibung.

■ AUFBEWAHRUNG

Bei 4°C (2 bis 6°C) in Dunkelheit. Nicht im Gefrierfach aufbewahren.

Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung aufgedruckt. Es wird kenntlich gemacht durch das vorangestellte Siegel "EXP" gefolgt von Monat und Jahr der Haltbarkeitsgrenze.

■ ZUSAMMENSETZUNG

Lyophilisiertes Vakzin :

- min. 10³ DICT₅₀ lebende, abgeschwächte Carré-Viren / Dose
- min. 300 DICT₅₀ adenotrope Hundeviren Typ 2, in abgeschwächter Form / Dose
- min. 10⁴ DICT₅₀ lebende abgeschwächte Hundeparvoviren / Dose

Diese drei Virusvalenzen werden auf Zellkulturen erzeugt.

Lactos. - L. Glutaminsäure - Dikal.phosph. - Kal.phosph. - Gelat. - Phenolsulfonephthal.

■ LÖSUNGSMITTEL

Aqua ad iniect. q.s. ad 1 ml

■ REGISTRIERUNGSINHABER UND HERSTELLER

VIRBAC S.A. • 1ère avenue • 2065 m • L.I.D. 06516 Carros • FRANCE

■ VERTRIEB

VIRBAC Belgium S.A. • B - 3001 Leuven

BE-V144304

Virbac

SANTÉ ANIMALE

Service Création

Dossier pris en charge par :

Nom du produit : CANIGEN CHP

Pays : BELGIQUE
Code produit fini : 302868
Élément : NOTICE
Code élément : 81477505
Logiciel utilisé : Illustrator CS5
Famille : 314
Format : 90 x 200
Offset AFNOR : VII - 80 G
Code pliage : Code i- 7 volets
Pliée 90 x 30

Observations : VV POA DU 06/02/12

COULEURS

RECTO

Bleu Reflex Blue



Rouge 485



VERSO

Bleu Reflex Blue

