

Preventef[®] ad us. vet.

UITWENDIG ANTIPARASITAIR MIDDEL / ANTIPARASITAIRE A USAGE EXTERNE /
ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG

KAT – CHAT – KATZE
(DIMPYLATE/DIMPYLAT)

■ **INDICATIE**

Bestrijding van vlooiëninfecties bij de kat.

■ **DOSERING EN GEBRUIKSWIJZE**

Juist voor het gebruik de halsband uit zijn oorspronkelijke verpakking nemen. Hem rond de hals van het dier bevestigen en vervolgens aanpassen.

Het overbodige stuk halsband afknippen. De halsband dient permanent door het dier gedragen te worden.

Werkingsduur : 5 maanden. Het is aangeraden gedurende het ganse jaar een halsband te dragen.

■ **CONTRA-INDICATIES**

Geen.

■ **ONGEWENSTE EFFECTEN**

Het dragen van de halsband veroorzaakt een verlaging van het plasmacholinesterase, dit echter zonder gevaar voor het dier. Deze plasmawaarden verhogen, zodra de halsband verwijderd wordt.

■ **BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN**

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

■ **GEBRUIK TIJDENS DE DRACHT**

Onbekend.

■ **INTERACTIES**

Uit voorzorgsmaatregelen is het aangeraden de halsband 24 tot 48 uur voor iedere anesthesie te verwijderen. Geen andere insecticiden (organofosfaten of carbamaten) gelijktijdig met de halsband gebruiken.

■ **OVERDOSERING/ANTIDOTUM**

In geval van intoxicatie kan men atropine toedienen in een dosis van 0,1 mg/kg intraveneus of subcutaan. Een tweede dosis kan toegediend worden in functie van de evolutie van de symptomen. Klinische symptomen van intoxicatie zijn : dyspnee, overvloedige speekselvloeï en stijfheid van de ledematen, met daarop volgend motorische incoördinatie.

■ **DIERSOORT WAARVOOR HET GENEESMIDDEL BESTEMD IS, TOEDIENINGSWIJZE, VERPAKKING EN WIJZE VAN AFLEVERING**

Antiparasitaire halsband voor uitwendig gebruik bij de kat.

Zakje met een halsband van 12,5 g.

Vrije verkoop.

■ **BEWARING**

Bij kamertemperatuur (tot 25°C), in zijn oorspronkelijke verpakking. Rekening houden met de vervaldatum vermeld op de verpakking : EXP. maand/jaar (de vervaldatum is de eerste dag van de vermelde maand).

■ **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

■ **DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN :** 09/2012

■ **INDICATION**

Lutte contre les puces.

■ **POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI**

Retirer le collier de son emballage étanche, juste avant l'emploi, et le fixer au cou de l'animal en l'ajustant. Couper la partie excédentaire. Le collier doit être laissé en permanence au cou de l'animal.

Durée d'action : 5 mois.

Le port du collier est indiqué toute l'année.

■ **CONTRA-INDICATIONS**

Néant.

■ **EFFETS INDESIRABLES**

Le port du collier entraîne une dépression des taux de cholinestérase plasmatique sans danger pour l'animal. Ces taux commencent à remonter dès le retrait du collier.

■ **PRECAUTIONS PARTICULIERES**

Ne laisser les enfants ni jouer avec le collier, ni le sucer.

■ UTILISATION EN CAS DE GESTATION

Néant.

■ INTERACTIONS

Par mesure de précaution, il est recommandé d'enlever le collier 24 à 48 heures avant toute anesthésie. Ne pas administrer d'autres insecticides (organophosphorés ou carbamates) en même temps que le collier.

■ SURDOSAGE/ANTIDOTE

En cas d'intoxication, l'antidote est le sulfate d'atropine, qui doit être administré à raison de 0,1 mg/kg par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Le renouvellement est fonction de l'évolution des symptômes d'intoxication, dont les signes cliniques sont dyspnée, une salivation intense, une raideur des membres pouvant conduire à une incoordination motrice.

■ ESPECES DE DESTINATION, FORME, VOIE D'ADMINISTRATION, CONDITIONNEMENT ET MODE DE DELIVRANCE

Collier insecticide, à usage externe, pour chats.

Etui d'1 sachet contenant 1 collier de 12,5 g.

Délivrance libre.

■ CONSERVATION

A température ambiante (jusqu'à 25°C) dans son emballage d'origine. Se référer à la date limite inscrite sur l'emballage : EXP. mois/année (la date d'expiration commence le premier jour du mois indiqué).

■ PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR L'ELIMINATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES NON UTILISES OU DES DECHETS DERIVES DE CES MEDICAMENTS, LE CAS ECHEANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

■ DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE : 09/2012

■ ANWENDUNGSGEBIETE

Gegen Flöhe.

■ DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG

Das Halsband vor Gebrauch der dichten Schutzhülle entnehmen und dem Hals des Tieres anpassen. Den überschüssigen Teil abschneiden.

Das Halsband soll ständig angelegt bleiben.

Wirkungsdauer : 5 Monate. Nach 5 Monaten soll ein neues Halsband angelegt werden, da das Halsband während des ganzen Jahres getragen werden soll.

■ GEGENANZEIGEN

Keine.

■ UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Das Tragen des Halsbandes ruft ein Absinken der Cholinesterase Plasmaspiegel hervor, allerdings ohne Gefahr für das Tier. Sobald das Halsband abgenommen wird, steigen diese Spiegel wieder an.

■ BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kinder dürfen weder mit dem Halsband spielen, noch es zum Mund führen.

■ ANWENDUNG WÄHREND DER TRÄCHTIGKEIT

Es liegen keine Daten vor.

■ WECHSELWIRKUNGEN

Als Vorsichtsmaßnahme empfiehlt sich, das Halsband 24 bis 48 Stunden vor einer Anästhesie abzunehmen. Beim Tragen des Halsbandes gleichzeitig keine anderen Antiparasitika (Organophosphate oder Carbamate) anwenden.

■ ÜBERDOSIERUNG/ANTIDOT

Bei Vergiftung ist Atropinsulfat das Antidot, welches in einer Dosis von 0,1 mg/kg intravenös oder subkutan zu verabreichen ist. Eine eventuelle neuerliche Injektion hängt vom Verlauf der Vergiftungssymptome ab. Klinische Vergiftungssymptome sind : Atemnot ; verstärkter Speichelfluss ; Gliedmassenstarre, die zu motorischen Störungen führen kann.

■ TIERARTEN, BEI DENEN DAS ARZNEIMITTEL ANGEWENDET WERDEN SOLL, DARREICHUNGSFORM, ART DER ANWENDUNG, HANDELSFORM UND ABGABE

Insektizides Halsband zur äusserlichen Anwendung bei Katzen.

Packung mit einem Halsband zu 12,5 g in Schutzhülle.

Rezeptfreie Abgabe.

■ AUFBEWAHRUNG

Bei Raumtemperatur (bis 25°C) in der Originalpackung. Bitte beachten Sie das Verfalldatum auf der Packung : EXP. Monat/Jahr (das Verfalldatum ist der erste Tag des angegebenen Monats).

■ BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

■ GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE : 09/2012

■ SAMENSTELLUNG – COMPOSITION – ZUSAMMENSETZUNG

Dimpylate/Dimpylat 15 g - Oleic./Linoleic./Linolenic.ac.ester. - Diethylhexyl.phtalal. - Epoxydat.soja oleum - Calc. stearas - Flash noir 19976® - Ferr. oxyd. rubr. - Flash beige 40232® - Silic. oxyd. colloïd. - Polyvinyl. chlorid. q.s. ad 100 g.

BE-V159607

DIERGEENEKUNDIG GEBRUIK – USAGE VETERINAIRE – ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG

■ FABRIKANT /REGISTRATIEHOUDER – FABRICANT/TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT – HERSTELLER/REGISTRIERUNGSINHABER

VIRBAC – F – 06516 Carros

■ DISTRIBUTEUR / VERTRIEB

Virbac Belgium - B - 3001 Leuven