

Registratiehouder en producent /
Titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché et libérateur de lots /
Zulassungsinhaber und Hersteller:
VIRBAC - 1ère avenue 2065 m LID
06516 Carros
Frankrijk/ France/ Frankreich

Verdeler / Distributeur / Vertrieb:
VIRBAC BELGIUM
B-3001 Leuven
BE-V336953
Alleen op recept verkrijgbaar /
Sur prescription /



8

714076 005105

83454905

Virbac

ECTOPARASITICIDES

EFFIPRO[®]

2,5 MG/ML HUIDSPRAY,
OPLOSSING VOOR HOND EN KAT

2,5 MG/ML SOLUTION POUR
PULVÉRISATION CUTANÉE
POUR CHATS ET CHIENS

2,5 MG/ML HAUTSPRAY,
LÖSUNG FÜR KATZEN
UND HUNDE

FIPRONIL



100 ml

EFFIPRO 2,5 mg/ml huidspray, oplossing voor hond en kat - Fipronil

NL

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Werkzaam bestanddeel: Fipronil 2,5 mg

FARMACEUTISCHE VORM: Huidspray oplossing.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Hond en kat

INDICATIE(S): Bestrijding van vlooiën (*Ctenocephalides spp.*) bij honden en katten. Bestrijding van teken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bij honden en katten. Bestrijding van bijtende luizen bij honden (*Trichodectes canis*) en katten (*Felicola subrostratus*). Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooiën veroorzaakte allergische dermatitis. Werkt tegen nieuwe infecties van volwassen vlooiën tot 6 weken bij katten en tot 3 maanden bij honden, afhankelijk van de omgevingsdruk. Het product heeft een acaricide werking tegen teken tot 4 weken, afhankelijk van de omgevingsdruk.

CONTRA-INDICATIE(S): Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN: Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speeksel worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof. In zeer zeldzame gevallen worden na gebruik mogelijke bijwerkingen gezien, te weten voorbijgaande roodheid, jeuk of lokaal haarverlies. In uitzonderlijke gevallen werden overmatig speeksel, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid voor prikkels, depressie, nerveuze verschijnselen), braken en ademhalingsproblemen gezien na gebruik. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiters worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Toedieningswijze: Alleen uitwendig gebruik. Dien het product toe op de huid met behulp van de pompspray.

Flacon met 100 ml: 1x pompen komt overeen met 0,5 ml.

Dosering: Maak de haren goed vochtig tot op de huid. Gebruik hiervoor 3-6 ml per kg lichaamsgewicht (dit komt overeen met 7,5 tot 15 mg werkzame stof per kg lichaamsgewicht) afhankelijk van de haarlengte.

Dit komt overeen met: 6-12x pompen per kg lichaamsgewicht voor de 100 ml flacon.

Afhankelijk van de vachtlengte is de inhoud van de 100 ml sprayflacon genoeg voor: 4-8 behandelingen van een kat van 4 kg of tot 3 behandelingen van een hond van 10 kg.

Gebruiksaanwijzing: Spray het gehele dier in en houd een afstand aan van ongeveer 10-20 cm. Verdeel het tegen de haren in en zorg dat de hele vacht goed vochtig wordt. Wrijf de vacht in, vooral bij langharige dieren zodat het product tot op de huid komt. Bij behandelen van het kopgebied en bij jonge of nerveuze dieren kan gesprayed worden op een handschoen waarmee het product daarna in de vacht gewreven wordt. Laat het dier drogen aan de lucht. Gebruik geen handdoek om het dier te drogen.



1. Spray tegen de haarrichting in



2. Gebruik een grote straal voor de rug en de flanken in staande positie
3. Gebruik een grote straal voor de borst en buik in zittende of liggende positie



4. Gebruik een kleine straal voor de poten en huidplooiën in staande positie
5. Breng het product aan op een handschoen voor het hoofd

Eigenschappen: Het product bevat een coating en daardoor ontstaat er een dunne laag op de haren die de vacht laat glanzen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Doseringschema: Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden. Door afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken. Puppies en kittens vanaf 2 dagen oud kunnen veilig worden behandeld.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort: Indien gebruikt als onderdeel van een behandlungsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, wordt een maandelijkse behandeling van de allergische patiënt en alle andere

katten en honden in het huishouden geadviseerd. Voor optimale effectiviteit is het aan te raden om de dieren niet te wassen van 2 dagen voor tot 2 dagen na de behandeling. Baden of wassen met shampoo tot maximaal 4x per 2 maanden heeft geen significant negatief effect op de resterende werking van het product. Als er vaker wordt gewassen wordt een maandelijks behandeling van het dier aanbevolen. Behandeling van de mand van het dier, de gewoonlijke rustplaatsen, tapijten en meubilair met een geschikt bestrijdingsmiddel zal helpen de omgevingsbesmetting te verminderen en daarmee de duur van de werkzaamheid van het product tegen herbesmetting te maximaliseren. Voor optimale vlooiën bestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden en katten te worden behandeld met een geschikt bestrijdingsmiddel.

Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden. Het product is niet geschikt als omgevingspray.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Gebruik niet meer dan de aangegeven dosering. Vermijd contact met de ogen van het dier. Niet direct sprayen op wonden en delen van de huid die beschadigd zijn. Behandelde dieren in een goed geventileerde ruimte laten drogen. Dieren niet in kleine ruimte of transportkooi zetten totdat het dier volledig is opgedroogd. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling. Houd dieren die gesprayed zijn weg bij open vuur of andere warmtebronnen. Houd de dieren weg bij oppervlakten die mogelijk gevoelig zijn voor de alcohol die de spray bevat, totdat de vacht helemaal droog is, minimaal 30 minuten.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden. Personen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd contact van de inhoud met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met water en zeep. Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen zorgvuldig met schoon water te worden gespoeld. Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de vacht droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de vacht droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen. Behandel dieren in de open lucht op een beschutte plek, uit de wind of in een goed geventileerde ruimte. De spray niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens toediening. Draag PVC of plastic handschoenen gedurende de behandeling van het dier. Aanbevolen wordt om een waterbestendig schort te dragen voor de bescherming van de kleding. Als de kleding toch erg nat wordt van het product, trek dan schone kleding aan en was de kleding voordat de kleding opnieuw wordt gebruikt. Gooi de plastic handschoenen weg en was de handen daarna grondig met water en zeep. Verwijder spetters op de huid meteen door te wassen met water en zeep. Als irritatie optreedt zoek medische hulp en neem de verpakking of bijsluiting mee. Dieren of toedieners met astma of een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie 6.1) kunnen extra gevoelig zijn

voor het product. Gebruik het product niet als u bij voorgaand gebruik reacties op het product had. Bij behandeling van meerdere dieren is goede ventilatie extra van belang. Behandel meerdere dieren buiten of voorkom dat de hoeveelheid damp van het middel groter wordt door behandelde dieren te verwijderen uit de behandelruimte, terwijl de alcohol vrijkomt door verdamping en ventileer de ruimte goed tussen de individuele behandelingen in. Zorg daarnaast dat de ruimte waarin de dieren drogen goed geventileerd wordt en voorkom dat meerdere recent behandelde dieren in dezelfde ruimte verblijven.

Andere voorzorgsmaatregelen: Fipronil is toxisch voor vissen en andere waterorganismen. Honden mogen niet zwemmen binnen 2 dagen na behandeling.

Gebruik tijdens dracht en lactatie: Laboratorium studies met fipronil hebben niet aangetoond dat er teratogene effecten zijn bij ratten en konijnen. Fipronil wordt zeer goed getolereerd door puppies, na behandeling van lacterende teven. Studies bij drachtige teven, poezen of zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik bij drachtige poezen en teven en zogende poezen dieren alleen in overeenstemming met professioneel veterinaire advies en nadat een afweging is gemaakt van de voor en nadelen.

Overdosering: Het risico van optreden van ongewenste effecten kan toenemen wanneer overdoseerd wordt. In het geval van overdosering dient een geschikte symptomatische behandeling te worden gestart.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM: Niet gebruiken wanneer de vervaldatum vermeld op de flacon verstreken is. Vervalt 1 jaar na het openen van de flacon. Na opening gebruiken tot:...

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN: Zeer ontvlambaar. Bewaren beneden 25°C. Buiten direct zonlicht houden.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. Het middel of de lege verpakking dient daarom niet in de vijvers, waterwegen of poelen terecht te komen.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN: september 2015

OVERIGE INFORMATIE: Verpakkingsgrootten: 100 ml, 250 ml, 500 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Wanneer de spray voor het eerst wordt geopend, dient te worden uitgerekend op welke datum de spray verwijderd moet worden. De houdbaarheid na het eerste gebruik is 1 jaar. Deze datum dient op het etiket te worden geschreven in de ruimte die daarvoor bestemd is.

EFFIPRO 2,5 mg/ml solution pour pulvérisation cutanée pour chats et chiens - Fipronil

FR

LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Principe actif : Fipronil 2,5 mg/ml

FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation cutanée.

ESPÈCES CIBLES : Chats et chiens

INDICATION(S) : Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.) chez le chien et le chat. Traitement des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) chez le chien et le chat. Le traitement des infestations par les poux broyeurs chez le chien (*Trichodectes canis*) et le chat (*Felicola subrostratus*). Le produit peut être utilisé dans le cadre d'une stratégie thérapeutique pour traiter la dermatite par allergie aux piqûres de puces (DAPP). La durée de l'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par des puces adultes est de 6 semaines chez le chat et de 3 mois chez le chien, selon le contexte environnemental. La durée de l'efficacité acaricide du produit est de 4 semaines contre les tiques, selon le contexte environnemental.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets indésirables voire la mort peuvent se produire en réaction au produit. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif, ou à l'un des excipients.

EFFETS INDÉSIRABLES : Si l'animal se lèche, on pourra observer un bref épisode d'hypersalivation, principalement lié à la nature du solvant. Parmi les effets indésirables suspectés extrêmement rares, des cas de réaction cutanée transitoire tels qu'érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après l'utilisation. Exceptionnellement, des cas d'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, dépression, symptômes nerveux), des vomissements ou des signes respiratoires ont été observés après l'utilisation.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voies d'administration : Pistolet pulvérisateur manuel à usage externe uniquement.

Le pistolet vaporise 0,5 ml (présentation de 100 ml) par pulvérisation.

Posologie : Afin d'humidifier le pelage jusqu'à la peau, appliquer 3 à 6 ml par kg de poids corporel (7,5 à 15 mg de principe actif par kg de poids corporel), selon la longueur des poils. On peut obtenir ce dosage avec 6 à 12 pulvérisations par kg de poids corporel de la présentation de 100 ml. Selon la longueur des poils, la présentation de 100 ml permet de traiter 4 à 8 fois un chat de 4 kg ou jusqu'à 3 fois un chien de 10 kg.

Mode d'administration : Régler l'embout du pistolet en position pulvérisation. Pulvériser le produit sur l'ensemble du pelage de l'animal à une distance de 10-20 cm environ. Appliquer dans le sens inverse de la pousse du poil en veillant à ce que l'ensemble du pelage de l'animal soit humidifié. Masser le pelage, en particulier chez les animaux à poils longs afin que le produit pénètre jusqu'à la peau. Pour le traitement de la zone autour de la tête, ou pour traiter des animaux jeunes ou nerveux, l'application peut se faire en pulvérisant d'abord le produit sur un gant et en frottant ensuite le gant sur le pelage. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser une serviette pour sécher l'animal.



1. Pulvériser à rebrousse-poil en maintenant l'animal



2. Utiliser le jet large pour le dos et les côtés, animal debout
3. Utiliser le jet large pour la poitrine et le ventre, animal assis ou couché



4. Utiliser le jet étroit pour les pattes et les plis de peau, animal debout
5. Pour la tête, appliquer le produit sur un gant

Propriétés: La formule contient un composé recouvrant. La pulvérisation crée donc un film qui se dépose sur le pelage et le rend brillant.

CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Schéma thérapeutique : Pour lutter efficacement contre les infestations par les puces et les tiques, le schéma thérapeutique peut s'appuyer sur la situation épidémiologique locale. En l'absence d'études d'innocuité, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines. Les chiots et les chatons peuvent être traités en toute sécurité dès l'âge de 2 jours.

MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Mises en garde particulières à chaque espèce cible : Dans le cadre d'une stratégie thérapeutique contre la dermatite par allergie aux piqûres de puces (DAPP), une application mensuelle du produit au patient allergique ainsi qu'aux autres chats et chiens du foyer est recommandée. Pour une efficacité optimale, il est recommandé de ne pas baigner les animaux ou leur faire de shampoing dans les deux jours précédents ou suivant le traitement avec le produit. Il a été montré que des bains ou des shampoings réalisés jusqu'à 4 fois en deux mois n'avaient pas un effet significatif sur l'efficacité résiduelle du produit. Pour des shampoings plus fréquents il est recommandé d'appliquer un traitement mensuel. Le traitement des zones où l'animal a l'habitude de se coucher telles que tapis, canapés, intérieurs de voiture etc. qui doivent être traités avec un insecticide approprié aidera à traiter l'environnement et maximisera la durée de protection du produit contre une ré-infestation. Pour lutter de manière optimale contre les problèmes de puces, dans un foyer où vivent plusieurs animaux, l'ensemble des chiens et des chats du foyer doivent être traités avec un insecticide approprié. Il est possible que des tiques isolées s'accrochent. Pour cette raison, dans des conditions défavorables, la transmission de maladies infectieuses ne peut pas être totalement écartée.

Le produit n'est pas approprié pour un traitement direct de l'environnement.

Précautions particulières d'utilisation chez les animaux : Ne pas dépasser la dose prescrite.

Éviter tout contact avec les yeux de l'animal. Ne pas pulvériser directement sur les zones de peau abîmée.

Veiller à laisser sécher les animaux traités dans une pièce bien aérée. Ne pas confiner les animaux dans un espace clos ou dans un panier de transport pour animaux tant que le pelage n'est pas totalement sec. Bien veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux après le traitement. Tenir les animaux éloignés du feu ou de toutes sources de chaleur, et des surfaces susceptibles d'être détériorées par la pulvérisation d'alcool, au moins pendant les 30 minutes qui suivent la pulvérisation et jusqu'à ce que le pelage soit entièrement sec.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : Ce produit peut causer une irritation des membranes muqueuses et des yeux. C'est pourquoi tout contact du produit avec la bouche ou les yeux doit être évité. Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux au fipronil ou l'un des excipients doivent

éviter tout contact avec le médicament vétérinaire. Éviter de toucher le contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec du savon et de l'eau. En cas d'exposition oculaire accidentelle, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau pure. Tant que le pelage n'est pas sec, les animaux traités ne doivent pas être manipulés et les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les animaux traités. Il est donc recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée, et de ne pas laisser les animaux qui viennent d'être traités dormir avec leurs maîtres, surtout avec les enfants. Pulvériser le produit sur les animaux à l'air libre ou dans une pièce bien aérée. Ne pas respirer le produit. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. Porter des gants en PVC ou en nitrile pour traiter les animaux. Il est recommandé de porter un tablier imperméable pour protéger les vêtements. En cas d'aspersion importante des vêtements avec le produit, ces derniers doivent être retirés et lavés avant de pouvoir être portés à nouveau. Jeter les gants après usage et se laver les mains avec du savon et de l'eau. Laver immédiatement les éclaboussures sur la peau avec du savon et de l'eau. En cas d'irritation, consulter immédiatement un médecin. Les personnes présentant une sensibilité connue ou souffrant d'asthme peuvent être particulièrement sensibles au produit. Ne pas utiliser le produit si vous avez déjà présenté des réactions au produit. Traitement de plusieurs animaux : il est essentiel de veiller à la bonne aération du lieu où plusieurs animaux doivent être traités. Pour traiter plusieurs animaux, appliquer le produit à l'extérieur, ou limiter l'accumulation de vapeurs en faisant sortir les animaux de la pièce où ils ont été traités en attendant que l'alcool s'évapore, et veiller à bien aérer la pièce entre deux traitements individuels. Veiller en outre à ce que la pièce de séchage soit bien aérée et éviter de placer plusieurs animaux récemment traités dans la même atmosphère.

Autres précautions : Le fipronil peut avoir un effet défavorable sur les organismes aquatiques. Ne pas laisser les chiens se baigner dans des cours d'eau pendant les 2 jours qui suivent l'application.

Utilisation en cas de gravidité ou de lactation : Les études en laboratoire n'ont pas révélé d'effets tératogènes du fipronil chez le rat et le lapin. Le fipronil est très bien toléré chez les chiots après traitement de femelles allaitantes. Aucune donnée d'études spécifiques portant sur l'utilisation du produit au cours de la gravidité des chiennes, des chattes ou la période d'allaitement des chattes n'est disponible. L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas encore été établie, par conséquent, l'utilisation ne doit se faire qu'après évaluation du bénéfice / risque établie par le vétérinaire.

Surdosage : Le risque d'effets indésirables peut augmenter en cas de surdosage.

Appliquer un traitement symptomatique approprié en cas de surdosage.

DATE DE PEREMPTION : Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le conditionnement.

Date de péremption après première utilisation : 1 an.

Après ouverture, utiliser avant ...

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Très inflammable. À conserver à une température inférieure à 25°C.
À conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT : Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales. Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou des emballages usagés.

À usage vétérinaire. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE : Septembre 2015

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : Présentations : 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Après la première ponction (ouverture), calculer la date à laquelle les restes du produit doivent être éliminés en fonction de la durée de conservation après ouverture, mentionnée sur cette notice. Noter cette date dans l'espace prévu à cet effet.

EFFIPRO 2,5 mg/ml Hautspray, Lösung für Katzen und Hunde - Fipronil

DE

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff(e): Fipronil 2,5 mg/ml

DARREICHUNGSFORM: Hautspray-Lösung

ZIELTIERART(EN): Katze und Hund

ANWENDUNGSGEBIET(E): Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides* spp.) bei Hunden und Katzen. Behandlung von Zeckenbefall (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bei Hunden und Katzen. Behandlung von Befall durch Beißläuse bei Hunden (*Trichodectes canis*) und Katzen (*Felicola subrostratus*). Das Produkt kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle von Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden.

Die insektizide Wirksamkeit gegen neuen Befall von erwachsenen Flöhen besteht bei Katzen für bis zu 6 Wochen, bei Hunden bis zu 3 Monaten, je nach Umfeld. Das Produkt hat eine persistente akarizide Wirksamkeit gegen Zecken für bis zu 4 Wochen, je nach Umfeld.

GEGENANZEIGEN: Nicht bei erkrankten (systemische Krankheiten, Fieber...) oder genesenden Tieren anwenden. Nicht bei Hasen anwenden, da Nebenwirkungen und sogar Tod die Folge sein können. Nicht bei Überempfindlichkeiten auf die Wirkstoffe oder Hilfsstoffe anwenden.

NEBENWIRKUNGEN: Wenn das Tier die Lösung ableckt, kann insbesondere vermehrter Speichelfluss durch die Trägerlösung beobachtet werden. Zu den seltenen Nebenwirkungen gehören vorübergehende Hautreaktionen wie Juckreiz oder Haarausfall. In einigen Ausnahmefällen wurden vermehrter Speichelfluss, reversible neurologische Symptome (Überempfindlichkeit, Depression, nervöse Symptome), Erbrechen oder Atemprobleme nach der Anwendung beobachtet. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Verabreichungsform: Mechanisches Pumpspray nur zur äußerlichen Anwendung.

Die Pumpe gibt 0,5 ml (100 ml Flasche) Spray pro Pumpeinheit ab.

Dosierung: Um das Fell bis auf die Haut zu befeuchten, wenden Sie 3 bis 6 ml pro kg Körpergewicht (7,5 bis 15 mg des Wirkstoffes pro kg Körpergewicht) an, je nach Haarlänge. Diese Dosis kann mit 6 bis 12 Pumpeinheiten pro kg Körpergewicht der 100 ml Flasche erreicht werden. Je nach Haarlänge ergibt die 100 ml Flasche 4 bis 8 Behandlungen einer Katze mit 4 kg oder bis zu 3 Behandlungen eines Hundes mit 10 kg.

Verabreichungsform: Besprühen Sie den gesamten Körper des Tieres aus einer Entfernung von etwa 10 bis 20 cm. Sprühen Sie gegen die Fellrichtung und achten Sie darauf, dass das gesamte Fell des Tieres feucht wird. Rubbeln Sie das Fell, insbesondere bei langhaarigen Tieren, so dass das Produkt bis auf die Haut dringen kann. Bei der Behandlung der Kopfregion sowie bei der Behandlung von jungen oder nervösen Tieren sollte das Produkt auf die Hand (mit Handschuhen) gesprüht und in das Fell einmassiert werden. Lassen Sie das Fell lufttrocknen. Nicht mit dem Handtuch trocken rubbeln.



1. Entgegen des Haarstrichs sprayen



2. Großer Sprühstrahl auf Rücken und Seiten beim stehenden Tier,
3. Großer Sprühstrahl auf Brust und Unterseite beim sitzenden oder liegenden Tier



4. Kleiner Sprühstrahl für Pfoten und Hautfalten beim stehenden Tier
5. Für den Kopf die Lösung auf einen Handschuh geben

Eigenschaften: Die Formel enthält eine filmbildende Substanz. Daher glänzt nach der Anwendung das Fell.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Behandlungsplan: Zur optimalen Beseitigung eines Floh- und/oder Zeckenbefalls kann der Behandlungsplan nach der epidemiologischen Situation vor Ort erstellt werden. Da keine Sicherheitsstudien vorliegen, beträgt die Mindestzeit zwischen den Behandlungen 4 Wochen. Hunde- und Katzenwelpen ab 2 Tagen können sicher behandelt werden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Wenn das Produkt als Teil eines Behandlungsplans gegen Flohallergiedermatitis verwendet wird, werden monatliche Anwendungen für das allergische Tier und andere Katzen und Hunde im Haushalt empfohlen. Für optimale Wirksamkeit sollte das Tier zwei Tage vor und nach der Behandlung mit dem Produkt nicht gebadet oder shamponiert werden. Bis zu vier Mal Baden oder Shamponieren in zwei Monaten hat keine spürbare Auswirkung auf die Residualwirkung des Produkts. Eine monatliche Behandlung mit dem Produkt wird im Falle von häufigerem Shamponieren empfohlen. Eine Behandlung von Schlafstellen, Teppichen und Polstermöbeln mit geeigneten Insektiziden maximiert die Dauer des Schutzes vor erneutem Befall. Zur optimalen Beseitigung des Flohproblems in einem Haushalt mit mehreren Tieren sollten alle Hunde und Katzen mit einem geeigneten Insektizid behandelt werden.

Möglicherweise gibt es einen Befall durch einzelne Zecken. Daher kann eine Krankheitsübertragung nicht vollständig ausgeschlossen werden, wenn die Umstände ungünstig sind. Das Produkt ist nicht zur direkten Behandlung der Umgebung geeignet.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren: Empfohlene Dosis nicht überschreiten.

Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen des Tieres. Nicht direkt auf beschädigte Haut aufsprühen.

Das Fell des behandelten Tieres sollte in einem gut belüfteten Raum trocknen.

Tier nicht in einen geschlossenen Raum oder Tragekorb einsperren, bis das Fell vollkommen getrocknet ist.

Es ist wichtig, dass die Tiere sich nach der Behandlung nicht gegenseitig ablecken. Halten Sie das Tier mindestens 30 Minuten nach Behandlung, und bis das Fell vollkommen trocken ist, von Feuer oder anderen Hitzequellen und auch Oberflächen fern, da letztere durch das alkoholische Spray beeinträchtigt werden können.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Dieses Produkt kann Reizungen der Schleimhaut und der Augen verursachen. Daher sollte ein Kontakt zwischen Produkt und Mund oder Augen vermieden werden. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Fipronil oder Hilfsstoffe sollten Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Kontakt mit den Fingern vermeiden. Wenn das Produkt versehentlich auf die Haut gelangt, muss diese mit Wasser und Seife gewaschen werden. Wenn das Produkt versehentlich in die Augen gelangt, müssen diese sofort und gründlich mit Wasser gespült werden. Direkten Kontakt mit der Applikationsstelle vermeiden, solange diese noch feucht ist. Kinder sind während dieser Zeit von dem behandelten Tier fern zu halten. Es wird daher empfohlen, dass Tiere nicht während des Tages sondern am frühen Abend behandelt werden. Darüber hinaus sollten frisch behandelte Tiere nicht bei den Besitzern, insbesondere Kindern, schlafen. Das Produkt nur im Freien oder einem gut belüfteten Raum aufsprühen. Spray nicht einatmen. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Während der Behandlung PVC- oder Nitril-Handschuhe tragen. Es wird empfohlen zum Schutz der Kleidung, eine wasserfeste Schürze zu tragen. Wenn die Kleidung durch das Produkt sehr nass wird, sollte die Kleidung entfernt und gewaschen werden. Handschuhe nach der Verwendung entsorgen und Hände mit Wasser und Seife waschen. Spritzer auf der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.

Wenn Reizungen auftreten, unverzüglich einen Arzt zu Rate ziehen. Menschen mit bekannter Empfindlichkeit oder Asthma können besonders empfindlich auf das Produkt reagieren. Produkt nicht verwenden, wenn Sie zuvor eine Reaktion darauf beobachtet haben. Behandlung von mehreren Tieren: Gute Belüftung ist bei der Behandlung mehrerer Tiere von besonderer Wichtigkeit. Behandeln Sie mehrere Tiere im Freien oder vermeiden Sie eine ansteigende Konzentration der Spraylösung durch Entfernen der Tiere aus dem Behandlungsraum, während der Alkohol verdunstet. Achten Sie auf gute Belüftung des Raums zwischen den einzelnen Behandlungen. Achten Sie außerdem darauf, dass der Raum zum Trocknen gut belüftet wird und bringen Sie mehrere frisch behandelte Tiere möglichst nicht im selben Raum unter.

Sonstige Vorsichtsmaßnahmen: Fipronil darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann. Hunde sollten in den ersten beiden Tagen nach der Behandlung nicht schwimmen.
Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode: Laboruntersuchungen ergaben keine Hinweise auf teratogene Wirkungen bei Ratten und Hasen. Fipronil wird von Welpen nach Behandlung der säugenden Mutter gut vertragen. Es wurden keine Studien mit dem Produkt an schwangeren und säugenden Hunde- oder Katzenmüttern durchgeführt. Die Sicherheit des Tierarzneimittels wurde nicht nachgewiesen, daher nur nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden.

Überdosis: Das Risiko von Nebenwirkungen kann im Falle einer Überdosis steigen.
Im Fall einer Überdosis ist eine entsprechende symptomatische Behandlung zu beginnen.

VERFALLDATUM: Das Arzneimittel nach Ablauf des auf der Flasche angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 1 Jahr.
Nach dem Anbrechen / Öffnen verwendbar bis ...

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE: Hochentzündlich. Nicht über 25°C lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN

Sofern erforderlich: Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Fipronil darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann. Teiche, Gewässer oder Bäche dürfen nicht mit dem Tierarzneimittel oder leeren Behältnissen verunreinigt werden.


Für Tiere. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE: September 2015

SONSTIGE INFORMATIONEN: Packungsgrößen: 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Nach dem ersten Anbrechen (Öffnen) des Behältnisses sollte das Entsorgungsdatum für das im Behältnis verbleibende Produkt mithilfe des Haltbarkeitsdatums auf diesem Etikett berechnet werden. Das Entsorgungsdatum sollte an der vorgesehen Stelle notiert werden.



Virbac

SERVICE CREATION

Nom du produit:
EFFIPRO SPRAY 100 mlPays : BE-NL VBI
Code PF : 305450
Élément : ETIQUETTE LIVRET
Code Élément : 83454905
Logiciel: INDESIGN CC

Code à Barres : OUI

CODE FAMILLE 2DB
DIMENSIONS : 65MM X 138MM INCIRC
REFERENCE FOURNISSEUR : VIR-65x138-IC V3
MATERIAU(X) / GRAMMAGE(S) :
- SUPPORT : HD 70MM X200MM
- ADHESIF : RP37
- BASE ETIQUETTE : PP WHITE TC 60
- LIVRET: GLOSS ART PAPER 90G/M2
- PELLICULAGE: 60µ GLOSS CLEAR LAMINATE
(BRILLANT TRANSPARENT)
- NOMBRE DE PAGES : 16
- NOMBRE DE PAGES IMPRIMABLES: 15
PARTICULARITÉ(S) :
- MANDRIN : 76MM
- SENS D'ENROULEMENT : C1
(EXTÉRIEUR DROIT AVANT)

COULEURS

REFLEX BLUE ROUGE 485 VERT 389 PROCESS CYAN Observations: corps de texte 5,8 pts
ecd 14/01/16