

EFFIPRO®

50 MG SPOT-ON OPLOSSING VOOR KATTEN
FIPRONIL

NL

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR RIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEN

Registratiehouder en producent:
VIRBAC - 1ère avenue 2065 m LID - 06516 Carros - FRANKRIJK

GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL EN OVERIGE BESTANDDELEN

Een pipet van 0,5 ml bevat:
Werkzaam bestanddeel: Fipronil 50 mg
Hulpstoffen: Butylhydroxyanisol (E320) 0,1 mg - Butylhydroxytolueen (E321) 0,05 mg

INDICATIES

Bestrijding van vlooiën (*Ctenocephalides* spp.) en teken (*Dermacentor reticulatus*). Het product heeft een insecticide werking tot 5 weken tegen vlooiën (*Ctenocephalides felis*). Het product heeft een acaricide werking tot 2 weken tegen teken (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Indien sommige soorten teken (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) bij toediening al aanwezig zijn, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen 1 week. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooiën veroorzaakte allergische dermatitis, indien dit van te voren door een dierenarts is vastgesteld.

CONTRA-INDICATIES

Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 2 maanden oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij ziekte (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speeksel worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de oplosmiddel. Als zeezeelden voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik gerapporteerd: voorbijgaande huidreacties op de plaats van toediening (huidschilfering, lokale kaaltheid, jeuk, roodheid) en pijn over het hele lichaam of kaalheid. In uitzonderlijke gevallen wordt overmatig speeksel, omkeerbare neurologische verschijnselen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen) of braken waargenomen. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS: Kat

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN EBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Dosering:

Alleen uitwendig gebruik. Dien 1 pipet van 0,5 ml per dier toe op de huid.

Toedieningsweg:

Thermogevoerde pipetten: 1. Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet om alle vloeistof onder te krijgen. 2. Knip of breek het topje van de spot-on af langs de breuklijn. 3. Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. 4. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid. 5. Knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Het is belangrijk om het product daar aan te brengen waar het dier hier niet van af kan likken en dat dieren elkaar niet likken direct na het aanbrengen van de vloeistof. Zorg er voor dat de haren niet erg nat worden na toediening omdat er dan een klevende plak kan ontstaan op de plaats van toediening. Als dit toch zou optreden zal de plak verdwijnen binnen 24 uur na toediening. Een wicthage plak kan worden waargenomen op de toedieningsplaats tot 48 uur na toediening.

Toedieningsschema:

Voor een optimale vlooiën en/of tekenbestrijding zal het behandelingschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Op een droge plaats bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking.

Niet gebruiken na de expiratie datum zoals vermeld op de pipet. Alleen vóór gebruik de pipetten uit de blister verpakking nemen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Vlooiën van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de gebruikelijke rustplaatsen, tapijten, stoffering en meubilair. Deze plekken moeten daarom behandeld worden bij aanvang van de bestrijdingsmaatregelen en in geval van een massale infestatie met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen. Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de blootstelling aan teken is behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48 uur gedood worden na de behandeling. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten. Eenmaal dood zullen teken van het dier vallen, maar wanneer dit niet gebeurt kunnen teken voorzichtig worden verwijderd. Het is aanbevolen te vermijden de kat veelvuldig te baden of te wassen met shampoo omdat de effectiviteitsduur van het product voor deze gevallen niet is onderzocht. Indien het product wordt gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooiën veroorzaakte allergische dermatitis, is het aanbevolen de allergische kat en de andere dieren in het huis maandelijks te behandelen. Voor optimale vlooiën bestrijding in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, onmiddellijk en grondig ogen spoelen met water.

Het product niet toedienen op wonden of beschadigde huid.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden. Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld. Als de irritatie aanhoudt zoek medische hulp en neem de verpakking of bijsluiter mee. Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep. Handen wassen na gebruik.

Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. Contact met dit diergeneesmiddel vermijden. Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen tot de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen.

Andere voorzorgsmaatregelen

Product en behandelde dieren niet in contact laten komen met geveerde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of stoffering.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Laboratorium studies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met professioneel veterinair advies en een baten/risico analyse.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Gebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

September 2015.

Verpakkingsgrootten:

Thermolome pipetten: Dozen met 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 24, 30, 60, 90 of 150 pipetten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

EFFIPRO 50 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHATS
FIPRONIL

FR

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:
VIRBAC - 1ère avenue 2065 m LID - 06516 Carros - FRANCE

LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Een pipette of 0,5 ml contient :

Principe actif : Fipronil 50 mg

Excipients : Butylhydroxyanisole E320 0,1 mg - Butylhydroxytoluène E321 0,05 mg

INDICATIES

Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.) et les tiques (*Dermacentor reticulatus*). L'efficacité insecticide du produit persiste jusqu'à 5 semaines contre les puces (*Ctenocephalides felis*). La durée de l'efficacité acaricide du produit est de 2 semaines contre les tiques (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Si des tiques de certaines espèces (*Rhipicephalus sanguineus* et *Ixodes ricinus*) sont présentes au moment de l'application du produit, elles peuvent ne pas être tuées dans les premières 48h, mais pourront l'être dans la première semaine.

Le produit peut être intégré dans un programme thérapeutique de traitement de la Dermatite par Hypersensibilité aux Piqures de Puces (DHPP) si celle-ci a été préalablement diagnostiquée par le vétérinaire.

CONTRE-INDICATIONS

In l'absence de données disponibles, le produit ne doit pas être utilisé sur des chats de moins de 2 mois et/ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets indésirables voire la mort peuvent se produire en réaction au produit. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif, ou à l'un des excipients.

EFFETS INDÉSIRABLES

Si l'animal se léche, on pourra observer un bref épisode d'hypersalivation, principalement lié à la nature du solvant. Parmi les effets indésirables suspectés extrêmement rares, des réactions cutanées transitoires (squamous, alopecie locale, prurit, érythème) sur le site d'application et des cas de prurit général ou d'alopecie ont été rapportés après l'utilisation. Exceptionnellement, des cas d'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperaésie, dépression, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après l'utilisation. Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

ESPÈCES CIBLES : Chats.

POSOLOGIE POUR CHAT CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie d'administration et dosage


A usage externe uniquement. Appliquer directement sur la peau 1 pipette de 0,5 ml par animal.

Mode d'administration

Pipettes thermolomées : 1. Détacher 1 pipette et la tenir droite.

Donner de petits coups sur la partie étroite de la pipette pour s'assurer que le contenu est bien descendu dans la partie

centrale de la pipette. 2. Rompre l'extrémité autocassable de la pipette pour spot-on en suivant la ligne gravée. 3. Écarter les poils de l'animal jusqu'à ce que la peau soit visible. 4. Placer l'embout de la pipette directement sur la peau. 5. Presser doucement plusieurs fois pour vider entièrement le contenu de la pipette. Répéter cette procédure en un ou deux différents points, préférentiellement à la base de la tête et entre les omoplates.



■ CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Il faut appliquer le produit sur une zone où l'animal ne puisse pas lécher et s'assurer que les animaux ne se lécheront pas entre eux après le traitement. Ne pas appliquer une quantité excessive de produit sur un même point pour éviter que les poils ne deviennent collants sur le site de traitement. Néanmoins, si cela se produit, l'aspect collant disparaîtra dans les 24 heures après l'application. Des dépôts blancs peuvent apparaître sur le site d'application jusqu'à 48 heures après l'application.

■ Schéma thérapeutique :

Pour lutter efficacement contre les infestations par les puces et les tiques, le schéma thérapeutique peut s'appuyer sur la situation épidémiologique locale. En l'absence d'études d'innocuité, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

■ CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. À conserver à une température ne dépassant pas 30°C. À conserver dans un endroit sec. À conserver dans le conditionnement d'origine. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la pipette.

Ne sortir les pipettes du surblistiel qu'au moment où elles doivent être utilisées.

■ MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Les puces des animaux infestent souvent le panier de l'animal, sa couche ou les zones où il a l'habitude de se coucher telles que tapis, canapés, intérieurs de voiture etc. qui doivent être traités avec un insecticide approprié et aspirés régulièrement en cas d'infestation massive et dès le début des mesures de contrôle. Le produit n'empêche pas les tiques de s'accrocher aux animaux. Si l'animal a été traité avant qu'il ne soit exposé aux tiques, celles-ci seront tuées dans les premières 24-48 heures après qu'elles se soient accrochées. Ce sera habituellement avant l'engorgement, ce qui minimise mais n'exclut pas la transmission des maladies. Une fois que les tiques sont mortes, elles tomberont de l'animal ; pour enlever celles qui restent accrochées, il suffit de tirer doucement dessus. Il est recommandé d'éviter des bains ou shampoings fréquents puisque la persistance de l'efficacité du produit n'a pas été testée pour ces cas-là. Dans le cadre d'un programme thérapeutique de traitement de la Dermatite par Hypersensibilité aux Piqures de Puces (DHPP), il est recommandé de procéder à des applications mensuelles du produit, sur l'animal hypersensible ainsi que sur les autres chats du foyer. Pour traiter les infestations par les puces de manière optimale dans un foyer où vivent plusieurs animaux, tous les chiens et chats du foyer doivent être traités avec un insecticide approprié.

■ Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Éviter tout contact avec le médicament vétérinaire. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau.

Ne pas appliquer le produit sur des blessures ou une peau abîmée.

■ Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Ce produit peut causer une irritation des membranes muqueuses et des yeux. C'est pourquoi tout contact du produit avec la bouche ou les yeux doit être évité. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau. Si l'irritation oculaire persiste, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette. Éviter de toucher le contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec du savon et de l'eau. Se laver les mains après usage.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application. Les personnes présentant une hypersensibilité connue au fipronil ou à l'un des excipients (voir rubrique 6.1) doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire. Tant que le site d'application n'est pas sec, les animaux traités ne doivent pas être manipulés et les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les animaux traités. Il est donc recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée, et de ne pas laisser les animaux qui viennent d'être traités dormir avec leurs maîtres, surtout avec les enfants.

■ Autres précautions

Le produit peut avoir des effets indésirables sur les surfaces peintes, vernies ou autres des matériaux et meubles de la maison.

■ Utilisation en cas de gravidité ou de lactation

Les études de laboratoire sur le fipronil n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes ou embryotoxiques. Aucune étude n'a été réalisée avec ce produit sur des femelles gestantes et allaitantes. L'utilisation du produit en cas de gravidité ou de lactation ne doit se faire qu'après évaluation bénéfice/risque établie par le vétérinaire.

■ PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales. Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre en danger les poissons. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou des emballages usagés.

■ DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Septembre 2015.

Présentations :

Pipettes thermoformées : Boîtes de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 ou 150 pipettes.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

EFFIPRO 50 MG SPOT-ON-LÖSUNG FÜR KATZEN FIPRONIL

DE

■ NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE**■ ZULASSUNGSWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber und Hersteller:

VRBAC - 1ère avenue 2065 m LID - 06516 Carros - FRANKREICH

■ WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine 0,5 ml Pipette enthält:

Wirkstoff: Fipronil 50 mg

Hilfsstoffe / Adjuvantien: Butylhydroxyanisol E320 0,1 mg - Butylhydroxytoluen E321 0,05 mg

■ ANWENDUNGSGEBIET(E)

Behandlung von Floh- (*Ctenocephalides spp.*) und Zeckenbefall (*Dermacentor reticulatus*). Das Tierarzneimittel hat eine persistierende insektizide Wirkung von bis zu 5 Wochen gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*). Das Produkt hat eine persistente akarizide Wirkung für bis zu 2 Wochen gegen Zecken (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Bei bestimmten Zeckenarten (*Rhipicephalus sanguineus* und *Ixodes ricinus*) werden möglicherweise nicht alle Zecken innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Auftragen abgetötet, sondern erst innerhalb einer Woche. Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, wo dies zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde.

■ GEGENANZEIGEN

Aufgrund fehlender Daten wird empfohlen, das Produkt nicht bei Katzenwelpen anzuwenden, die jünger als 2 Monate und/oder leichter als 1 kg Gewicht sind.

Nicht bei Erkrankungen (systemische Krankheiten, Fieber...) oder gesunden Tieren anwenden.

Nicht bei Hasen anwenden, da Nebenwirkungen und sogar Tod die Folge sein können. Nicht bei Überempfindlichkeiten gegenüber dem Wirkstoff oder den Hilfsstoffen anwenden.

■ NEBENWIRKUNGEN


Wenn das Tier die Lösung ableckt, kann insbesondere vermehrter Speichelfluss durch die Trägerlösung auftreten.

Bei den äußerst seltenen Nebenwirkungen gehören vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Schuppen, lokaler Haarausfall, Juckreiz, Hautrötung) und allgemeiner Juckreiz oder Haarausfall. In einigen Ausnahmefällen wurden vermehrte Speichelfluss, reversible neurologische Symptome (Überempfindlichkeit, Depression, nervöse Symptome) oder Erbrechen nach der Anwendung beobachtet. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

■ ZIELTIERART: Katze**■ DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Art der Anwendung und Dosierung: Nur zur äußerlichen Anwendung. Lokale Anwendung auf die Haut 1 Pipette mit 0,5 ml pro Tier.

Verabreichungsform: Thermogeformte Pipetten: 1. Halten Sie die Pipette senkrecht. Klopfen Sie an dem engen Teil der Pipette, damit sich der komplette Inhalt im Hauptteil der Pipette befindet. 2. Knicken Sie die Verschlusskappe der Spot-On-Pipette entlang der markierten Linie ab. 3. Scheiteln Sie das Fell, so dass die Haut sichtbar wird. 4. Setzen Sie die Pipettenspitze auf die Haut und drücken Sie die Pipette mehrmals, um den Inhalt direkt auf der Haut. 5. Drücken zu entleeren. Wiederholen Sie das Verfahren an einer oder zwei anderen Stellen im Nackenbereich der Katze, bevorzugt an der Schädelbasis und zwischen dem Schulter.

**■ HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Das Produkt ist als Lösung nahe der Schädelbasis und der Augen vorzuziehen. Es verringert die Möglichkeit, dass das Tier, die Lösung ableckt. Es sollte darauf geachtet werden, dass sich die Tiere nach der Behandlung nicht gegenseitig ablecken. Das Fell sollte nicht übermäßig nass werden, da dies die Haare an der Applikationsstelle verklebt. Tritt dies jedoch auf, verschwindet es innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung. Bis 48 Stunden nach der Behandlung können weiße Reste zu sehen sein.

Behandlungsplan: Zur optimalen Beseitigung eines Floh- und/oder Zeckenbefalls kann ein Behandlungsplan nach der epidemiologischen Situation vor Ort erstellt werden. Da keine Sicherheitsstudien vorliegen, beträgt die Mindestzeit für die nächste Behandlung 4 Wochen.

■ BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel zugänglich für Kinder aufbewahren. Unter 30°C lagern. Trocken lagern. Im Originalbehältnis aufbewahren. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf der Pipette angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Das Tierarzneimittel erst unmittelbar vor Anwendung aus der Blisterverpackung entfernen.

■ BESONDERE WARNHINWEISE

Flöhe von Haustieren befallen häufig auch den Korb, das Bett und Ruheplätze wie Teppiche und Polstermöbel. Bei intensivem Befall und zu Beginn der Kontrollmaßnahmen sollten daher Korb, Bett und Ruheplätze mit einem geeigneten Insektizid behandelt und regelmäßig gesaugt werden. Das Tierarzneimittel verhindert nicht, dass einzelne Zecken das Tier befallen. Wenn das Tier vor dem Zeckenbefall behandelt wurde, werden diese Zecken in den ersten 24-48 Stunden abgetötet. Die Abtötung erfolgt üblicherweise vor dem Vollsaugen, so dass das Risiko einer durch Zecken übertragbaren Krankheit dadurch reduziert, aber nicht vollständig ausgeschlossen kann. Sobald die Zecken abgetötet sind, fallen sie im Allgemeinen vom Tier ab, verbleibende Zecken können mit sanftem Zug entfernt werden. Vermeiden Sie häufiges Baden oder Shampooieren, da keine Daten zum Einfluss von Baden/Shampooieren auf die Wirksamkeit des Tierarzneimittels zur Verfügung stehen. Als Teil eines Behandlungsplanes gegen Flohallergiedermatitis, werden monatliche Anwendungen für den allergischen Patienten und andere Katzen im Haushalt empfohlen. Zur optimalen Beseitigung des Flohproblems in einem Haushalt mit mehreren Tieren sollten alle Hunde und Katzen mit einem geeigneten Insektizid behandelt werden.

■ Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Kontakt mit den Augen des Tieres vermeiden. Wenn das Produkt versehentlich in die Augen gelangt, müssen diese sofort und gründlich mit Wasser gespült werden. Wenden Sie das Produkt nicht auf Wunden oder beschädigter Haut an.

■ Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Das Produkt kann Reizungen der Schädelbasis und der Augen verursachen. Daher sollte der Kontakt mit Mund oder Augen vermieden werden. Wenn das Produkt versehentlich in die Augen gelangt, müssen diese sofort und gründlich mit Wasser gespült werden. Wenn die Augenreizung bestehen bleibt, ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuziehen. Vermeiden Sie Kontakt des Inhalts mit den Fingern. Wenn das Produkt versehentlich auf die Haut gelangt, muss diese mit Wasser und Seife gewaschen werden. Nach der Anwendung Hände waschen. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Fipronil oder den Hilfsstoffen sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Applikationsstelle, solange diese noch feucht ist. Kinder sind während dieser Zeit von dem behandelten Tier fern zu halten. Es wird daher empfohlen, dass Tiere nicht während des Tages sondern am frühen Abend behandelt werden. Darüber hinaus sollten frisch behandelte Tiere nicht bei den Besitzern, insbesondere Kindern, schlafen.

■ Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

Die alkoholische Trägerlösung kann bestimmte Materialien, z. B. bemalte, lackierte oder andere Oberflächen oder Möbel beschädigen.

■ Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode

Laboruntersuchungen mit Fipronil ergaben keine Hinweise auf teratogene oder embryotoxische Wirkungen. Es wurden keine Studien bei tragenden und säugenden Katzen durchgeführt. Daher bei Trächtigkeit und Laktation nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt anwenden.

■ BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELEN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Fipronil darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

Teiche, Gewässer oder Bäche dürfen nicht mit dem Tierarzneimittel oder leeren Behältnissen verunreinigt werden.

■ GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

September 2015.

Packungsgrößen:

Thermogeformte Pipetten Schachtel mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 oder 150 Pipetten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

■ NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN / NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ / ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V336962 - Op dieneigene kennis voorschrijf. / Sur prescription vétérinaire. / Verschreibungspflichtig.

Verdeler / Distributeur: Mitvetribec

VRBAC Belgium S.A. - Esperantolaan 4 - B-3001 LEUVEN